PROVA AMRIGS 2019

PRÉ-REQUISITO: ANESTESIOLOGIA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem a Prova AMRIGS, ACM e AMMS.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.

3. Certifique-se de que este caderno:
   - contém 30 (trinta) questões;
   - refere-se ao(s) pré-requisito(s) da especialidade para a qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular.

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.

7. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a Grade de Respostas devidamente preenchida, a Pesquisa de Satisfação e a Prova, caso deixe o local de prova antes das 2h de início da prova.

8. Os candidatos que deixarem o local de provas antes do tempo previsto poderão levar consigo a capa da prova, que contém, no verso, um espaço para anotação dos gabaritos. Será disponibilizado no site da AMRIGS, ACM e AMMS a prova padrão.

9. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.

10. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução.

Boa prova!

V2_30/10/201910:13:0
Controle de QUALIDADE Fundatec
Concursos Fundatec
ISO 9001:2015
A Fundatec utiliza papel com certificação florestal

Espaço para anotação dos gabaritos

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

QUESTÃO 01 – A reação de hipersensibilidade tardia ou tipo IV resulta da interação de linfócitos sensibilizados com antígenos específicos. Manifesta-se em 18-24 horas, tem pico em 40-80 horas e desaparece entre 72-96 horas. Qual a condição clínica associada?

A) Rinite alérgica.
B) Trombocitopenia induzida por heparina.
C) Doença do soro.
D) Dermatite de contato.

QUESTÃO 02 – Qual a fibra nervosa de localização pré-ganglionar simpática e com função autonômica?

A) Aα.
B) Aβ.
C) Aδ.
D) B.

QUESTÃO 03 – Qual o anestésico local metabolizado por colinesterase plasmática?

A) Lidocaína.
B) Prilocaína.
C) Procaína.
D) Etidocaína.

QUESTÃO 04 – Paciente com morte cerebral declarada e sendo operado para remoção de órgãos para doação. Qual sua classificação ASA?

A) Classe 4.
B) Classe 5.
C) Classe 5E.
D) Classe 6.

QUESTÃO 05 – Qual parâmetro possuí maior especificidade para avaliar via aérea difícil?

A) Abertura bucal.
B) Classificação de Mallampati.
C) Distância tireomentoniana.
D) Distância esternomentoniana.

QUESTÃO 06 – Qual o tempo de jejum necessário após ingesta de bebidas carbonatadas?

A) 2 horas.
B) 4 horas.
C) 6 horas.
D) 8 horas.

QUESTÃO 07 – O sistema límbico corresponde a um grupo de estruturas que tem função cognitiva, de consolidação de memória e de respostas emocionais. Qual das estruturas abaixo faz parte do sistema límbico?

A) Mesencéfalo.
B) Hipotálamo.
C) Lobo occipital.
D) Córtex sensitivo primário.

QUESTÃO 08 – Um paciente apresentando cefaleia severa com rigidez de nuca teria qual avaliação na classificação de Hunt e Hess?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

QUESTÃO 09 – Qual o halogenado que contém bromo em sua estrutura química?

A) Halotano.
B) Enflurano.
C) Sevoflurano.
D) Desflurano.

QUESTÃO 10 – O mecanismo analgésico do xenônio ocorre por:

A) Agonismo em receptores opioides.
B) Inibição do receptor NMDA.
C) Antagonismo em receptores glutamatérgicos.
D) Inibição do receptor gaba.

QUESTÃO 11 – Qual o hipnótico que inibe a conversão do colesterol em cortisol?

A) Propofol.
B) Midazolam.
C) Etomidato.
D) Cetamina.

QUESTÃO 12 – Mulher, 33 anos, 70 Kg e 1,67m apresenta alodinia e alteração de coloração e temperatura em tornozelo esquerdo após imobilização com tala ortopédica por entorse. Qual fármaco estaria mais indicado para administração endovenosa para o manejo da dor crônica?

A) Morfina.
B) Fentanil.
C) Cetamina.
D) Midazolam.

QUESTÃO 13 – Qual a condição clínica que prolonga o tempo de recuperação após administração do vecurônio?

A) Febre.
B) Diabetes melito.
C) Hipertensão arterial sistêmica.
D) Síndromes desmielinizantes.

QUESTÃO 14 – Qual o fármaco que precipita em via endovenosa se administrado logo após o tiopental?

A) Pancurônio.
B) Atracúrio.
C) Sufentanil.
D) Vecurônio.

QUESTÃO 15 – A pregabalina age mediante:

A) Inibição dos receptores glutamatérgicos.
B) Ativação dos receptores gabaérgicos.
C) Ligação aos canais de cálcio pré-sinápticos.
D) Inibição dos canais de sódio pós-sinápticos.

QUESTÃO 16 – A ativação da enzima óxido nítrico-sintetase no processo de cronificação da dor dá-se por:

A) Elevação dos níveis de cálcio.
B) Inibição do receptor NMDA.
C) Inibição da proteína cinase C.
D) Ativação de receptor opioide.

QUESTÃO 17 – Qual a indicação para implante de eletrodos para neuroestimulação medular?

A) Angina pectoris crônica e refratária.
B) Cefaleia em salvas.
C) Fratura patológica do fêmur.
D) Metástase em coluna vertebral.

QUESTÃO 18 – Paciente em uso de morfina 90 mg/dia por via oral necessita rodar opioide para metadona devido ao aparecimento de dor neuropática. Qual a dose inicial de metadona sugerida?

A) 15 mg.
B) 30 mg.
C) 45 mg.
D) 60 mg.

QUESTÃO 19 – Qual o antiemético que tem sua ação mediada por antagonismo no receptor da neurocinina 1?

A) Meclizina.
B) Aprepitanto.
C) Dronabinol.
D) Haloperidol.

QUESTÃO 20 – Qual o aminoácido que tem transporte celular alterado pela infusão endovenosa de lidocaína?

A) Aspartato.
B) Glutamato.
C) Glicina.
D) Triptofano.

QUESTÃO 21 – A lamotrigina age na neuralgia do trigêmeo refratária por:

A) Inibição da liberação de glutamato e aspartato.
B) Bloqueio dos canais de potássio voltagem-dependente.
C) Ativação da adenilciclase.
D) Inibição dos canais de cálcio pré-sinápticos.

QUESTÃO 22 – Qual o fator de risco para desenvolvimento de dor crônica pós-operatória?

A) Idade avançada.
B) Gênero masculino.
C) Apoio familiar.
D) Ansiedade.

QUESTÃO 23 – O fármaco lipossolúvel utilizado em sedação paliativa que causa inconsciência rapidamente e de maneira confiável com dose de manutenção de 0,5 mg/kg/h é:

A) Midazolam.
B) Clorpromazina.
C) Clonidina.
D) Fenobarbital.

QUESTÃO 24 – Qual o fitoterápico com ação inibitória na agregação plaquetária e com potencial para sangramento aumentado no intraoperatório?

A) Valeriana.
B) Kawa-Kawa.
C) Erva de São João.
D) Alho.

QUESTÃO 25 – A atividade diária que corresponde a maior número de equivalentes metabólicos em avaliação cardiovascular pré-operatória é:

A) Lavar pratos.
B) Caminhar ao redor do domicílio.
C) Praticar golfe.
D) Comer.

QUESTÃO 26 – Qual o medicamento utilizado para o tratamento da hipertermia maligna que inibe a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático?

A) Nifedipina.
B) Verapamil.
C) Dantrolene.
D) Clorpromazina.

QUESTÃO 27 – O nível do bloqueio analgésico necessário para a realização de uma cesariana é:

A) T6.
B) T8.
C) T10.
D) T12.

QUESTÃO 28 – Sobre anestesia ambulatorial, é correto afirmar que:

A) Pacientes com classificação ASA 4 têm contraindicação formal à realização de procedimentos ambulatoriais.
B) Adultos com infecção viral nas vias aéreas devem ter a cirurgia adiada por 6 semanas.
C) A anestesia regional não é bem indicada a nível ambulatorial.
D) Bloqueios de nervos periféricos diminuem a dor pós-operatória, mas aumentam a incidência de náuseas e vômitos.

QUESTÃO 29 – Qual a medida terapêutica eficaz no tratamento da hiperalgesia induzida por opioides?

A) Utilizar morfina em altas doses.
B) Administrar cetamina em doses baixas.
C) Utilizar antagonistas de canais lentos de cálcio.
D) Administrar agonistas glutamatérgicos.

QUESTÃO 30 – O fator de risco associado a sintomas neurológicos transitórios após administração de anestesia subaracnóidea é:

A) Uso de bupivacaína.
B) Posição em prona.
C) Adultos jovens.
D) Anestesia ambulatorial.