

Long-hauler

Desfechos neurológicos e psiquiátricos de 6 meses em 236.379 sobreviventes de COVID-19:

	Todos pacientes	Não hospitalizados	Hospitalizados	UTI	Encefalopatia
Hemorragia intracraniana	0,56%	0,31%	1,31%	2,66%	3,61%
AVC isquêmico	2,10%	1,33%	4,38%	6,92%	9,35%
Parkinsonismo	0,11%	0,07%	0,20%	0,26%	0,46%
A síndrome de Guillain-Barré	0,08%	0,05%	0,22%	0,33%	0,48%
Doenças do nervo, raiz nervosa ou plexo	2,85%	2,69%	3,35%	4,24%	4,69%
Junção mioneural ou doença muscular	0,45%	0,16%	1,24%	3,35%	3,27%
Encefalite	0,10%	0,05%	0,24%	0,35%	0,64%
Demência	0,67%	0,35%	1,46%	1,74%	4,72%
Humor, ansiedade ou transtorno psicótico	23,98%	23,59%	24,50%	27,78%	36,25%
Transtorno de humor	13,66%	13,10%	14,69%	15,43%	22,52%
Transtorno de ansiedade	17,39%	17,51%	16,40%	19,15%	22,43%
Transtorno psicótico	1,40%	0,93%	2,89%	2,77%	7,00%
Transtorno por uso de substâncias	6,58%	5,87%	8,56%	10,14%	11,85%
Insônia	5,42%	5,16%	5,95%	7,50%	9,82%
Qualquer diagnóstico	33,62%	31,74%	38,73%	46,42%	62,34%

