

ESTAÇÃO 1 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CLÍNICA MÉDICA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Cumprimenta o paciente simulado (1) e se apresenta (2). Adequado: executa os dois itens. Inadequado: executa apenas um item ou não executa nenhum item.	0		0,5
2. Realiza perguntas pertinentes ao caso: Uso de medicamentos e outras drogas (1), diabetes (2) e presença de transtornos psiquiátricos, exceto sintomas de ansiedade e de irritabilidade (3). Adequado: pergunta os três itens. Parcialmente adequado: pergunta um ou dois itens. Inadequado: não pergunta nenhum dos itens.	0	0,5	1,5
3. Solicita exame físico.	0		1,0
4. Solicita exames laboratoriais de hormônios tireoideanos (validar se solicitar explicitamente hormônios tireoideanos, ou TSH e T4 livre). Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.	0		2,0
5. Solicita ultrassonografia de tireoide. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.	0		1,5
6. Hipótese diagnóstica: Faz o diagnóstico de hipertireoidismo. Adequado: faz. Inadequado: não faz.	0		2,0
7. Cita o tratamento clínico. Adequado: cita Betabloqueadores (Propranolol, atenolol, metoprolol) ou bloqueador canal de cálcio (verapamil, ou diltiazem) e tionamidas: propiltiouracil, metimazol (esses se for doença de Graves). Parcialmente adequado: cita pelo menos tionamidas: propiltiouracil, metimazol (esses se for doença de Graves). Inadequado: não cita nenhum tratamento medicamentoso ou cita tratamento inadequado.	0	0,75	1,5

ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CIRURGIA GERAL

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
Anamnese e Exame Físico			
1. Identifica-se e identifica adequadamente a paciente perguntando idade e profissão. Adequado: Realiza todos os comandos. Parcialmente adequado: Realiza somente um comando. Inadequado: Não realiza nenhum dos comandos.	0	0,15	0,3
2. Pergunta sobre as características da dor (tempo de início, localização, escala, progressão, fatores de melhora ou piora). Adequado: Pergunta sobre todas as características da dor. Parcialmente adequado: Pergunta sobre três das características da dor. Inadequado: Pergunta sobre duas características ou menos da dor.	0	0,2	0,4
3. Realiza anamnese perguntando por sintomas associados (náuseas, vômitos, ritmo intestinal, febre). Adequado: Pergunta sobre todos os sintomas. Parcialmente adequado: Pergunta sobre dois sintomas. Inadequado: Pergunta por apenas um sintoma ou não pergunta sobre os sintomas.	0	0,2	0,4
4. Pergunta sobre antecedentes cirúrgicos e anormalidades nas fezes (alterações nas características das fezes e sangramentos). Adequado: Pergunta sobre os dois assuntos. Inadequado: Pergunta por um ou não pergunta sobre os assuntos.	0		0,6
5. Solicitou/tomou iniciativa de realizar o exame físico. Adequado: Solicita os sinais vitais e/ou toma iniciativa de realizar o exame físico. Inadequado: Não verifica e/ou não toma iniciativa de realizar o exame físico.	0		0,3
Investigação diagnóstica			
6. Solicita os exames complementares laboratoriais como plano diagnóstico. Adequado: Solicita hemograma, PCR, eletrólitos e função renal. Parcialmente adequado: Solicita pelo menos hemograma e eletrólitos. Inadequado: Solicita um exame ou não solicita nenhum exame.	0	0,5	1

ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

7. Solicita os exames complementares de imagem como plano diagnóstico. Adequado: Solicita rotina radiológica de abdome agudo / raio X de abdome. Parcialmente adequado: Solicita tomografia computadorizada de abdome. Inadequado: Não solicita nenhum exame.	0	0,5	1
8. Interpreta de maneira adequada exames bioquímicos. Adequado: Identifica e verbaliza HMG com leucocitose leve, PCR aumentado, creatinina aumentada e eletrólitos baixos. Parcialmente adequado: Identifica e verbaliza as alterações do hemograma e eletrólitos. Inadequado: Não interpreta os exames como alterados.	0	0,4	0,8
9. Interpreta de maneira adequada o raio X fazendo hipótese diagnóstica de obstrução intestinal alta.	0		1
CONDUTA TERAPÊUTICA			
10. Inicia medidas de suporte adequadamente (jejum, hidratação endovenosa, reposição de eletrólitos e analgesia). Adequado: Orienta 4 medidas. Parcialmente adequado: Orienta pelo menos duas medidas. Inadequado: Orienta uma ou nenhuma medida	0	0,5	1
11. Inicia medidas de tratamento clínico com passagem de sonda nasogástrica. Adequado: Orienta a passagem de sonda. Inadequado: Não orienta a passagem de sonda.	0		0,8
RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS DO PACIENTE			
12. Explica adequadamente hipóteses diagnósticas para a paciente simulada (obstrução intestinal alta e baixa, neoplasia). Adequado: Explica duas possibilidades. Parcialmente adequado: Explica uma possibilidade. Inadequado: Não explica nenhuma das possibilidades.	0	0,25	0,5
13. Responde adequadamente sobre o motivo da obstrução intestinal. Adequado: Explica de forma acessível o que são bridas. Inadequado: Não responde corretamente a pergunta.	0		0,5
14. Explica sobre a tentativa de tratamento clínico e possibilidade de tratamento cirúrgico. Adequado: Explica adequadamente e de forma compreensível as duas possibilidades de tratamento. Parcialmente adequado: Explica apenas o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico. Inadequado: Não explica nenhum tratamento.	0	0,5	1
15. Explica que a via de acesso pode ser	0	0,2	0,4

ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Cirurgia Geral

laparoscópica e/ou aberta.

Adequado: Explica que pode ser pelas duas vias, com preferência pelo vídeo, se for possível.

Parcialmente adequado: Explica definindo somente uma via: aberta ou por vídeo.

Inadequado: Não responde a pergunta.

ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO PEDIATRIA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Apresenta-se à mãe simulada, pergunta nome da mãe ou nome do bebê. Adequado: se apresenta e pergunta o nome da mãe e/ou do bebê ou de ambos. Inadequado: não se apresenta nem pergunta quaisquer itens acima.	0		0,2
2. Questiona antecedentes gestacionais (gestações prévias, abortos e partos anteriores).	0		0,2
3. Questiona (1) via de parto e (2) amamentação. Adequado: pergunta de ambos os itens. Parcialmente adequado: pergunta apenas sobre um dos itens. Inadequado: não pergunta sobre via de parto nem sobre amamentação.	0	0,3	0,6
4. Pergunta a tipagem sanguínea da mãe.	0		0,5
5. Pergunta se a mãe fez imunoglobulina anti-D após a gestação anterior.	0		0,5
6. Realiza o exame físico do RN.	0		0,5
7. Dá o diagnóstico de Icterícia.	0		0,5
8. Solicita tipagem sanguínea do RN.	0		0,5
9. Solicita exames laboratoriais (Bilirrubinas totais e frações, <i>Coombs</i> direto, hematócrito/hemograma, reticulócitos, DHL). Adequado: solicita 3 ou mais exames que estão contidos no impresso 3, sendo 1 deles obrigatoriamente Bilirrubinas totais e frações. Parcialmente adequado: solicita 2 exames que estão contidos no impresso 3, sendo 1 deles obrigatoriamente	0	1,0	2,0

ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

<p>Bilirrubinas totais e frações. Inadequado: não solicita exames OU solicita apenas Bilirrubinas, OU solicita exames sem ter Bilirrubinas nas opções. Obs.: só serão pontuados neste item os exames solicitados antes da entrega do impresso 3. Caso o(a) participante cite que gostaria de pedir mais algum exame após a entrega do impresso, não será atribuída pontuação.</p>			
<p>10. Institui Fototerapia com fotoproteção ocular. Adequado: institui fototerapia com proteção ocular. Parcialmente adequado: cita fototerapia, mas sem fotoproteção ocular. Inadequado: não institui tratamento.</p>	0	0,5	1,0
<p>11. Explica para mãe o fator de risco para desenvolvimento da Icterícia (apesar de ser um RN termo e com peso adequado, apresenta incompatibilidade sanguínea ABO e do fator Rh, após gestação prévia). Adequado: cita as duas incompatibilidades. Parcialmente adequado: cita incompatibilidade apenas de um dos fatores: ABO ou Rh. Inadequado: não explica estes fatores.</p>	0	0,5	1,0
<p>12. Cita recoleta de Bilirrubinas após um tempo de fototerapia para avaliar suspensão do tratamento e avaliar alta hospitalar.</p>	0		0,5
<p>13. Explica à mãe os fatores de risco para desenvolvimento de Kernicterus (nível alto de Bilirrubinas por tempo prolongado em pacientes sem terapêutica).</p>	0		0,5
<p>14. Cita os demais cuidados/medidas a serem feitos com o RN (testes de triagem neonatais, vacinação na primeira semana de vida, cuidados com o coto umbilical, incentivo ao aleitamento materno): Adequado: cita três ou mais das medidas dos cuidados gerais com o RN. Parcialmente adequado: cita duas das medidas dos cuidados gerais com o RN. Inadequado: cita apenas uma ou não cita nenhuma das medidas dos cuidados gerais com o RN.</p>	0	0,5	1,0
<p>15. Mantém postura acolhedora com a mãe e pergunta se tem alguma outra dúvida.</p>	0		0,5

ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Apresenta-se (1) e pergunta o nome da paciente (2). Adequado: realiza os dois procedimentos. Inadequado: realiza apenas um ou não realiza nenhum dos procedimentos.	0,0		0,3
2. Pergunta sobre a data da última menstruação da paciente (1) ou sobre o seu ciclo menstrual (2). Adequado: realiza as 2 ações. Parcialmente adequado: faz uma das ações. Inadequado: não faz nenhuma das ações.	0,0	0,25	0,5
3. Pergunta sobre uso de métodos contraceptivos atuais (1) e se pretende engravidar em breve (2). Adequado: realiza as 2 ações. Parcialmente adequado: faz uma das ações. Inadequado: não faz nenhuma das ações.	0,0	0,25	1,0
4. Interpreta corretamente o resultado dos exames. Adequado: considera a ecografia transvaginal normal e a citologia alterada. Parcialmente adequado: considera a ecografia transvaginal e a citologia alteradas. Inadequado: considera a citologia normal (independente do que considerou para a ecografia transvaginal).	0,0	0,5	1,5
5. Indica que, pela alteração da citologia oncótica, é necessário que a paciente faça uma colposcopia.	0,0		1,5
6. Indica que o DIU de cobre é um método adequado para esta paciente, mas que antes de indicar a inserção do DIU, a paciente deverá fazer o exame complementar do colo uterino. Adequado: diz que o DIU pode ser bem indicado para a paciente de acordo com sua história clínica, mas que antes ela deve fazer o exame de colposcopia e levar na consulta. Inadequado: diz que o DIU está contraindicado independente de outras investigações OU diz que o DIU pode ser inserido mesmo antes da investigação com colposcopia.	0,0		2,0
7. Orienta sobre a eficácia do DIU: esclarecendo que ele é um método contraceptivo de alta eficácia, mas que não existe nenhum método contraceptivo 100% eficaz. Adequado: deixa claro que o DIU é um método muito eficaz, mas que não tem índice de 100% de eficácia. Inadequado: diz que não há perigo de engravidar com o DIU, mesmo se bem acompanhada.	0,0		1,0

ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

<p>8. Cita as contraindicações para inserção do DIU de cobre: 1. Câncer de colo uterino aguardando diagnóstico/tratamento; 2. Gravidez; 3. Aborto séptico recém-tratado; 4. Sangramento uterino anormal inexplicado ainda sem diagnóstico; 5. Câncer de endométrio; 6. Anormalidades da anatomia uterina; 7. Doença inflamatória pélvica atual; 8. Cervicite purulenta atual; 9. Tuberculose pélvica conhecida.</p> <p>Adequado: informa, além do câncer de colo uterino, pelo menos mais duas contraindicações à inserção do DIU.</p> <p>Parcialmente adequado: informa, além do câncer de colo uterino, mais uma contraindicação à inserção do DIU ou informa apenas câncer de colo uterino como contraindicação à inserção do DIU.</p> <p>Inadequado: não informa câncer de colo uterino como contraindicação à inserção do DIU.</p>	0,0	0,5	1,0
<p>9. Pergunta se há mais alguma dúvida.</p>	0,0		0,2
<p>10. Orienta que o próximo passo será a paciente fazer a colposcopia (1) e levar o resultado para ele(a) na UBS (2) e que, caso esteja tudo bem com o exame, eles(as) irão conversar sobre o DIU como método contraceptivo e sobre a inserção (3).</p> <p>Adequado: informa os três pontos.</p> <p>Inadequado: informa até dois pontos ou não informa nenhum ponto.</p>	0,0		1,0

ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente Adequado	Adequado
HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO			
<p>1. Cumprimenta o paciente (1), se identifica de maneira cordial (2), identifica o paciente (3) e pergunta o motivo da consulta (4).</p> <p>Adequado: realiza as quatro ações. Parcialmente adequado: realiza duas ou três ações. Inadequado: realiza apenas uma ou não realiza nenhuma ação.</p>	0,0	0,25	0,5
<p>2. Estabelece contato visual (1), mantém a postura de empatia ao longo da consulta (2), evita “culpabilizar” o paciente pelo seu quadro atual (3) e usa linguagem acessível evitando termos técnicos de difícil compreensão (4).</p> <p>Adequado: realiza as quatro ações. Parcialmente adequado: realiza duas ou três ações. Inadequado: realiza apenas uma ou não realiza nenhuma ação.</p>	0,0	0,25	0,5
<p>3. Responde às perguntas trazidas pelo paciente (1), sem interrompê-lo desnecessariamente (2).</p> <p>Adequado: executa corretamente as duas ações. Parcialmente adequado: executa corretamente apenas uma das ações. Inadequado: não realiza corretamente nenhuma das ações.</p>	0,0	0,25	0,5
CONHECIMENTOS E HABILIDADES EM UM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NA APS			
<p>4. Investiga as características anginosas da dor torácica: Padrão anginoso (1), Fatores de piora (2), Fatores de melhora (3), Localização (4), Duração da dor (5).</p> <p>Adequado: investiga quatro ou cinco dos principais elementos da angina típica. Parcialmente adequado: investiga dois ou três dos cinco principais elementos da angina típica. Inadequado: investiga apenas uma ou não investiga nenhuma das características anginosas da dor torácica.</p>	0,0	0,50	1,00
<p>5. Pergunta sobre uso de tabaco, álcool e outras drogas.</p> <p>Adequado: pergunta sobre o uso de ao menos duas drogas. Parcialmente adequado: pergunta sobre o uso de apenas uma droga. Inadequado: não aborda no atendimento o uso de drogas.</p>	0,0	0,25	0,50
<p>6. Pergunta sobre os hábitos alimentares (1) e prática de atividade física (2).</p> <p>Adequado: pergunta sobre os dois hábitos. Parcialmente adequado: pergunta sobre apenas um hábito. Inadequado: não pergunta sobre nenhum dos hábitos.</p>	0,0	0,25	0,50

ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

<p>7. Pergunta sobre doenças ou condições prévias (ex.: HAS, dislipidemia, AVC e AIT prévios, doença arterial periférica, diabetes e tabagismo) (1) e estado vacinal (2). Adequado: realiza as duas perguntas. Parcialmente adequado: realiza apenas uma das duas perguntas. Inadequado: não realiza nenhuma pergunta.</p>	0,0	0,25	0,50
<p>8. Pergunta sobre doenças na família (ex.: histórico familiar de doença coronariana precoce).</p>	0,0		0,50
<p>9. Indica a realização de exame físico e/ou Sinais Vitais – Impresso 1.</p>	0,0		0,50
<p>10. Indica a realização de ECG de repouso 12 derivações (Impresso 2) e faz a sua correta interpretação. Adequado: indica o ECG e cita: angina típica ou IAM com Supra ST, ou IAMST, ou Supradesnivelamento de ST em V1 a V4 (parede anterior) com imagem espelho em D2, D3 e AVF (parede inferior). Parcialmente adequado: indica o ECG, mas interpreta somente como IAM ou angina. Inadequado: não indica o ECG ou indica e interpreta errado.</p>	0,0	1,00	2,00
<p>11. Indica as medicações adequadamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ácido acetilsalicílico; 2. dinitrato de isossorbida; 3. morfina, se a dor for refratária ao uso do nitrato; 4. não indica suplementação de oxigênio pela SPO2AA > 92%; 5. outras medicações: betabloqueador, estatina, IECA, clopidogrel, heparina. <p>Adequado: cita os quatro primeiros itens. Parcialmente adequado: indica pelo menos dois dos quatro primeiros itens. Inadequado: cita apenas um ou não cita nenhum dos itens.</p>	0,0	0,50	1,0
<p>12. Indica a necessidade de monitorização contínua (1) e acesso venoso periférico (2). Adequado: indica as duas ações. Parcialmente adequado: indica apenas uma das ações. Inadequado: não indica nenhuma das ações.</p>	0,0	0,25	0,75
<p>13. Indica a necessidade de remoção segura por uma ambulância gratuita com DEA e profissionais de saúde treinados para outro serviço com suporte cardiológico para Angioplastia ou Trombólise (1), informa a necessidade de contato prévio com o hospital de referência (2) e não afasta a possibilidade de que o(a) participante possa ir junto na ambulância para realizar a remoção (3). Adequado: indica corretamente as três ações. Parcialmente adequado: indica ao menos uma das ações. Inadequado: não indica nenhuma das ações. Ou indica 2 e/ou 3, porém indica transporte inseguro (liberar paciente para ir por meios próprios, com ou sem o acompanhamento do(a) participante).</p>	0,0	0,75	1,00
<p>14. Busca acalmar o paciente, explica os próximos passos e como se espera a evolução das condutas propostas.</p>	0,0		0,25

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CLÍNICA MÉDICA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Cumprimenta o paciente simulado (1) e se apresenta (2). Adequado: executa os dois itens. Inadequado: não executa nenhum item ou executa apenas um dos itens.	0		0,5
2. Realiza anamnese. Pergunta fatores concomitantes para hepatopatia (icterícia, hemorragia, alteração no sono, febre, dor, volume de diurese, aspecto da urina e coloração de fezes). Adequado: cita mais que três itens. Parcialmente adequado: cita três itens. Inadequado: não cita nenhum item ou até dois itens.	0	0,5	1,0
3. Solicita exame físico geral. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.	0		1,0
4. Interpreta exames laboratoriais. Aumento de taxas hepáticas, aumento de bilirrubinas mista corroborando com icterícia. Plaquetopenia – hipertensão porta. Adequado: interpreta. Inadequado: não interpreta.	0		2,0
5. Hipótese diagnóstica: faz o diagnóstico de cirrose hepática descompensada com ascite. Adequado: diagnostica. Inadequado: não diagnostica.	0		2,0
6. Solicitação do procedimento: Solicita paracentese diagnóstica e alívio e encaminha ao serviço de referência. Adequado: solicita e encaminha ao serviço de referência. Inadequado: não solicita e não encaminha ao serviço de referência.	0		1,5
7. Proposta terapêutica. Dieta hipossódica. Diuréticos (espironolactona e furosemida). Adequado: orienta. Inadequado: não orienta.	0		2,0

ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO CIRURGIA GERAL

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
ATENDIMENTO INICIAL AO TRAUMA			
1. Identifica-se e identifica adequadamente o paciente.	0		0,2
2. Avalia e verbaliza se as vias aéreas estão pervias.	0		0,4
3. Verbaliza a necessidade de permanência do colar cervical e da máscara de oxigênio. Adequado: Verbaliza a necessidade dos dois itens. Parcialmente adequado: Verbaliza a necessidade de um dos dois itens. Inadequado: Não verbaliza a necessidade de nenhum dos dois itens.	0	0,2	0,4
4. Realiza ou verbaliza o exame do aparelho respiratório.	0		0,6
5. Identifica e verbaliza o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo.	0		1,0
REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS			
6. Escolhe adequadamente o cateter n.º 14 para realização da punção.	0		0,8
7. Descreve a punção no quinto espaço intercostal, linha axilar anterior ou média. Adequado: Descreve adequadamente. Inadequado: Não descreve.	0		1
8. Indica a drenagem torácica fechada após a realização da punção de descompressão.	0		0,8
9. Escolhe adequadamente o dreno (números 32 ou 36) para realização da drenagem.	0		0,8
10. Descreve a drenagem no quinto espaço intercostal, linha axilar média. Adequado: Descreve adequadamente. Inadequado: Não descreve.	0		1
11. Solicita raio x de tórax após a punção ou drenagem.	0		0,5
12. Solicita monitoração da paciente (FC, PA e oximetria).	0		0,3
13. Realiza ou verbaliza novamente o exame do aparelho respiratório após os procedimentos.	0		0,5
14. Realiza ou verbaliza o exame do aparelho cardiovascular.	0		0,3

ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Cirurgia Geral

15. Solicita um segundo acesso venoso calibroso.	0		0,3
16. Realiza ou verbaliza o exame do D do trauma (Escala de coma de Glasgow e reação de pupilas).	0		0,3
17. Realiza ou verbaliza a exposição de toda a paciente com prevenção da hipotermia.	0		0,3
18. Responde ao chefe de equipe que, no momento, NÃO será necessária remoção da paciente após a entrega do IMPRESSO 3.	0		0,5

ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO PEDIATRIA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Apresenta-se à mãe simulada, pergunta nome da mãe ou nome do bebê. Adequado: apresenta-se e pergunta o nome da mãe e/ou do bebê ou de ambos Inadequado: não se apresenta nem pergunta o nome da mãe ou do bebê.	0		0,2
2. Questiona quanto a antecedentes gestacionais (gestações prévias, abortos e partos anteriores).	0		0,5
3. Questiona quanto às consultas pré-natais e intercorrências gestacionais (uso de medicamentos, sangramentos, vacinação, exames, patologias): Adequado: pergunta sobre as consultas pré-natais e 3 ou mais intercorrências. Parcialmente adequado: pergunta sobre as consultas pré-natais e 2 intercorrências. Inadequado: pergunta sobre as consultas pré-natais e apenas 1 intercorrência ou não pergunta sobre as consultas pré-natais nem sobre as intercorrências.	0	0,5	1
4. Pergunta a via de parto.	0		0,5
5. Pergunta quanto à estrutura familiar / rede de apoio.	0		0,4
6. Pergunta quanto à ocupação materna / tempo de licença gestacional.	0		0,4
7. Pergunta quanto à amamentação e faz o diagnóstico alimentar (erro alimentar, com ingesta de bebida açucarada). Adequado: questiona quanto à amamentação e identifica erro alimentar. Parcialmente adequado: pergunta da amamentação, mas não identifica erro alimentar. Inadequado: não pergunta da amamentação e não identifica quanto ao erro alimentar.	0	0,75	1,5
8. Dá a classificação do bebê ao nascimento (RN pré-termo tardio, baixo peso) e no dia da consulta. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR ADEQUADO APENAS SE CLASSIFICAÇÃO COMPLETA.	0		0,5
9. Classifica o desenvolvimento neuropsicomotor como adequado para idade corrigida.	0		0,5
10. Indica suplementações de Ferro e Vitamina D. Adequado: indica as 2 suplementações. Parcialmente adequado: indica suplementação somente de vitamina D ou somente de Ferro. Inadequado: não indica suplementação de vitamina D nem de Ferro.	0	0,5	1,0

ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

11. Identifica atraso vacinal e indica vacinação conforme o PNI (Rotavírus Humano, VIP, Penta, Pneumo 10, Meningo C): Adequado: nomeia as 5 vacinas corretas a serem aplicadas. Parcialmente adequado: cita entre 3 e 4 vacinas corretas a serem aplicadas; Inadequado: não indica qualquer vacina, indica vacinas incorretas ou nomeia até 2 corretas.	0	0,5	1,0
12. Realiza o exame físico do bebê.	0		0,5
13. Usa o gráfico pondero-estatural e identifica peso abaixo do esperado para idade, com comprimento e PC adequados. OBSERVAÇÃO: CONSIDERAR ADEQUADO SOMENTE SE CLASSIFICAÇÃO COMPLETA.	0		1,0
14. Orienta retorno para consulta de seguimento adequado de puericultura e reforça o aleitamento materno exclusivo. OBSERVAÇÃO: É NECESSÁRIO REALIZAR AMBAS AS ORIENTAÇÕES.	0		0,5
15. Mantém postura acolhedora com a mãe e pergunta se tem alguma outra dúvida.	0		0,5

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO

ESTAÇÃO GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1-Atendimento inicial e anamnese			
1. Apresenta-se (1) e pergunta o nome da paciente (2). Adequado: realiza as duas ações. Inadequado: não realiza nenhuma das ações ou realiza apenas uma das ações.	0,0		0,3
2. Pergunta sobre a história reprodutiva (gestações e partos). Adequado: pergunta. Inadequado: não pergunta.	0,0		0,3
3. Pergunta a data da última menstruação (1). Pergunta sobre ciclos menstruais antes da gravidez (2). Adequado: pergunta os dois itens. Parcialmente adequado: pergunta apenas um dos itens. Inadequado: não pergunta.	0,0	0,15	0,3
4. Pergunta se está fazendo pré-natal (1) e/ou solicita o cartão da gestante (2). Adequado: pergunta os dois itens. Parcialmente adequado: pergunta apenas um dos itens. Inadequado: não pergunta.	0,0	0,15	0,3
5. Pergunta sobre alguma intercorrência recente (p. ex. acidente, violência doméstica, uso de medicamento não prescrito, tentativa de induzir abortamento). Adequado: pergunta 2 ou mais dos itens descritos. Parcialmente adequado: pergunta 1 dos itens descritos. Inadequado: não pergunta.	0,0	0,15	0,3
2-Exame			
6. Verbaliza a necessidade de calçar luvas de procedimento. Adequado: verbaliza. Inadequado: não verbaliza.	0,0		0,3
7. Verbaliza a necessidade do exame especular. Adequado: verbaliza. Inadequado: não verbaliza.	0,0		0,5
8. Verbaliza a necessidade de realizar toque vaginal bimanual. Adequado: verbaliza. Inadequado: não verbaliza.	0,0		0,5
9. Após leitura do impresso 3, tranquiliza a paciente, explicando que no momento não se trata de abortamento. Adequado: tranquiliza (aceitar como adequado caso o(a) participante mencione “ameaça de abortamento”). Inadequado: não tranquiliza.	0,0		1,5
3-Condução			
10. Solicita ultrassonografia obstétrica. Adequado: solicita.	0,0		1,0

Inadequado: não solicita.			
11. Responde à paciente que ela não vai precisar ficar internada. Adequado: responde que não precisa de internação. Inadequado: responde que precisa de internação.	0,0		1,5
12. Responde à paciente que ela pode tomar um analgésico ou antiespasmódico (hioscina/escopolamina) para cólica – para este item pontuar se o(a) participante falar o nome de medicações analgésicas ou antiespasmódicas ou se apenas falar a classe da medicação. (não considerar se o(a) participante mencionar o uso de progesterona ou outras medicações). Adequado: responde e cita medicação adequada. Inadequado: não responde ou cita medicação inadequada.	0,0		1,0
13. Tranquiliza a paciente de que o bebê dela está bem e que agora não está com nenhum sinal de problema na gestação (1). Explica que o quadro de ameaça de abortamento tem que ser acompanhado (2). Explica que ela tem que estar atenta aos sinais de alarme, como aumento das cólicas ou sangramentos (3). Adequado: realizou pelo menos duas das ações acima. Parcialmente adequado: realizou apenas uma das ações acima. Inadequado: não realizou nenhuma das ações acima.	0,0	0,5	1,5
14. Responde à paciente que não pode manter relações sexuais enquanto persistir o sangramento. Adequado: responde que não pode manter relações sexuais. Inadequado: não responde ou cita que pode manter relações sexuais.	0,0		0,5
15. Pergunta se a paciente tem mais alguma dúvida. Adequado: pergunta. Inadequado: não pergunta.	0,0		0,2

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTO ESTAÇÃO MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO			
1. Cumprimenta a paciente (1), se identifica de maneira cordial (2), identifica a paciente (3), pergunta (4) e ouve com atenção o motivo da consulta (5). Adequado: realiza as cinco ações. Parcialmente adequado: realiza de duas a quatro ações. Inadequado: realiza apenas uma ação ou não realiza nenhuma ação.	0,0	0,25	0,50
2. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta.	0,0		0,25
3. Usa linguagem acessível, evitando termos técnicos de difícil compreensão.	0,0		0,25
4. Responde às perguntas trazidas pela paciente.	0,0		0,25
CONHECIMENTOS E HABILIDADES EM UM ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTÂNEA			
5. Pergunta sobre sintomas/sinais que possam indicar a presença de um foco infeccioso: tosse, dispneia, diarreia, disúria, polaciúria, dor abdominal. Adequado: pesquisa ao menos três potenciais focos de infecção. Parcialmente adequado: pesquisa um ou dois potenciais focos de infecção. Inadequado: não realiza nenhuma pesquisa de foco de infecção em paciente febril.	0,0	0,25	0,75
6. Pergunta sobre sinais/sintomas de alarme: dor abdominal intensa e contínua; vômitos persistentes; hipotensão postural e/ou lipotímia; hepatomegalia dolorosa; sangramento de mucosas; hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena); sonolência e/ou irritabilidade; diminuição da diurese; hipotermia; aumento repentino de hematócrito; queda abrupta de plaquetas; desconforto respiratório; cefaleia intensa. Adequado: pesquisa ao menos três sinais/sintomas de alarme. Parcialmente adequado: pesquisa um ou dois sinais/sintomas de alarme. Inadequado: não realiza nenhuma pesquisa de sinais/sintomas de alarme.	0,0	0,50	0,75
7. Pergunta sobre contexto socioambiental. Adequado: pesquisa o contexto socioambiental. Inadequado: não pesquisa o contexto socioambiental.	0,0		0,50
8. Indica a realização de exame físico (Impresso 1).	0,0		0,50
9. Explica corretamente a medida e os resultados da pressão arterial em duas posições e da prova do laço (Impresso 1). Adequado: explica corretamente a aferição da PA em duas posições e o achado positivo da prova do laço. Parcialmente adequado: apenas explica corretamente a positividade da prova do laço ou da aferição da PA em duas	0,0	0,50	1,00

ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

posições. Inadequado: não explica nenhum dos dois resultados das duas ações; ou interpreta equivocadamente o resultado da prova do laço ou da aferição da PA.			
10. Solicita adequadamente os exames laboratoriais específicos de dengue (impressos 2 e 3). Adequado: indica a necessidade de realização de exames específicos para dengue em caso ou paciente índice para confirmação diagnóstica esclarecendo o tempo ideal de coleta: fora de períodos epidêmicos, através da realização dosagem de NS1 (considerar teste rápido de dengue), RT-PCR para dengue, isolamento viral de dengue, idealmente antes do 4º dia, ou sorologia de dengue IgM (este a partir do 6º dia). Parcialmente adequado: indica os exames sem esclarecer o tempo ideal de coleta. Inadequado: não indica os exames específicos de dengue.	0,0	0,50	0,75
11. Diagnostica adequadamente o quadro como dengue e o estadiamento clínico como grupo B. Adequado: faz o diagnóstico de dengue e classifica adequadamente como dengue grupo B. Parcialmente adequado: faz o diagnóstico de dengue, porém não classifica adequadamente como dengue grupo B. Inadequado: não faz o diagnóstico de dengue.	0,0	0,50	1,00
12. Explica corretamente a forma de contágio da dengue.	0,0		0,50
13. Indica a necessidade de abordagem comunitária, com ação multiprofissional. Considerar adequada se citar ao menos uma outra categoria profissional (ex.: agente comunitária da saúde ou enfermeiro ou agente de combate a endemias).	0,0		0,50
14. Indica ações de vigilância epidemiológica necessárias ao caso: notificação no SINAN de casos suspeitos de dengue (1), avaliação de novos casos no território (2) e intervenção em criadouros (3). Adequado: indica ao menos duas ações de vigilância. Parcialmente adequado: indica apenas uma ação de vigilância. Inadequado: não indica nenhuma ação de vigilância epidemiológica necessária ao caso.	0,0	0,25	1,00
15. Indica tratamento sintomático, com reforço à reidratação imediata, além de atenção aos sinais de alarme. Adequado: indica o uso de sintomáticos e explica a dosagem adequada de SRO e reidratação (80ml/kg/dia de líquidos, sendo 1/3 disso com SRO). Considerar adequado se apesar de não esclarecer a dose do SRO, indicar os sintomáticos e não acrescentar outras medicações não indicadas (ex.: antibióticos e oseltamivir). Parcialmente adequado: indica SRO, mas não explica dosagem adequada de SRO, e não indica o tratamento sintomático. Inadequado: indica outros medicamentos que não o sintomático e não indica SRO.	0,0	0,25	1,0
16. Encerra o atendimento listando os problemas levantados e ações pactuadas (1), apraza o retorno em menos de 48h pelo estadiamento clínico (Grupo B) (2), esclarece sobre os sinais e sintomas de alarme (3), solicita novo hemograma (4), além de	0,0	0,25	0,5

ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

questionar sobre dúvidas adicionais (5).

Adequado: garante retorno oportuno e mais uma ação.

Parcialmente adequado: apenas garante o retorno oportuno, sem nenhuma ação adicional. Ou cita duas ou mais das ações listadas, sem indicar o retorno oportuno.

Inadequado: não garante o retorno oportuno. Ou cita apenas uma das ações listadas.