

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Apresenta-se (1) e identifica adequadamente o paciente (2). Adequado: realiza os 2 comandos. Parcialmente adequado: realiza somente 1 comando. Inadequado: não realiza nenhum dos comandos.	0	0,12	0,25
2. Realiza anamnese, com perguntas referentes a: tosse (intensidade, produtiva ou seca, associação a tabaco): (1), dispneia (2), febre (3), antecedente de asma (4) ou alergias (5). Adequado: se pergunta 4 ou 5 itens. Parcialmente adequado: se pergunta 2 a 3 itens. Inadequado: se pergunta apenas 1 item ou nenhum.	0	0,75	1,5
3. Solicita exame físico (1) e cita achados anormais(2). Adequado: realiza os 2 comandos. Inadequado: realiza apenas 1 comando ou nenhum.	0		0,5
4. Solicita Radiografia de tórax.	0		0,5
5. Interpreta a espirometria (1) e estabelece o diagnóstico de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) (2). Adequado: realiza os 2 itens. Parcialmente adequado: realiza somente 1 item. Inadequado: não realiza nenhum dos itens.	0	0,75	1,5
6. Estabelece uma hipótese diagnóstica associada de tumor pulmonar.	0		1,5
7. Orienta terapêutica para DPOC: cessação do tabagismo (1) e broncodilatadores (2) Adequado: realiza os 2 itens. Parcialmente adequado: realiza somente 1 item. Inadequado: não realiza nenhum dos itens.	0	0,5	1,0
8. Encaminha o paciente para serviço de referência (oncologia ou pneumologia) para estabelecer o diagnóstico de tumor/câncer de pulmão.	0		1,5
9. Esclarece que o diagnóstico definitivo se dá por meio de biópsia.	0		1,5
10. Oferece ao paciente oportunidade de esclarecer todas as dúvidas.	0		0,25

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Apresenta-se (1) e identifica adequadamente o paciente (2). Adequado: realiza os 2 comandos. Parcialmente adequado: realiza somente 1 comando. Inadequado: não realiza nenhum dos comandos.	0	0,12	0,25
2. Pergunta sobre as características da dor: tempo de início (1), localização (2), progressão (3), fatores de melhora ou piora (4). Adequado: pergunta todos os 4 itens. Parcialmente adequado: pergunta 2 ou 3 itens. Inadequado: pergunta apenas 1 ou nenhum item.	0	0,12	0,25
3. Realiza anamnese perguntando por sintomas associados: náuseas ou vômitos (1), ritmo intestinal (2), febre (3), sintomas urinários(4). Adequado: pergunta todos os 4 itens. Parcialmente adequado: pergunta 2 ou 3 itens. Inadequado: pergunta apenas 1 ou nenhum item.	0	0,25	0,5
4. Pergunta sobre antecedentes cirúrgicos(1) e comorbidades (2). Adequado: pergunta sobre os dois itens. Parcialmente adequado: pergunta sobre um item. Inadequado: não pergunta nenhum dos itens.	0	0,25	0,5
5. Solicita o exame físico.	0		0,5
6. Solicita os exames complementares de imagem como plano diagnóstico. Adequado: solicita tomografia de abdome sem contraste. Inadequado: não solicita nenhum exame ou solicita exame incorreto.	0		1,0
7. Interpreta de maneira adequada exames laboratoriais: Hemograma com leucocitose (1) e função renal alterada (2). Adequado: verbaliza os 2 itens. Parcialmente adequado: verbaliza 1 item. Inadequado: verbaliza nenhum item.	0	0,25	0,5

8. Interpreta de maneira adequada a tomografia de abdome, fazendo hipótese diagnóstica de uropatia obstrutiva/litíase urinária (1) com infecção urinária (2). Adequado: fornece a hipótese diagnóstica de uropatia obstrutiva/litíase urinária com infecção urinária. Parcialmente adequado: fornece apenas a hipótese diagnóstica de infecção urinária OU a de uropatia obstrutiva/litíase urinária. Inadequado: não informa diagnóstico correto.	0	1,0	2,0
CONDUTA TERAPÊUTICA			
9. Indica antibioticoterapia endovenosa.	0		1,0
10. Indica tratamento cirúrgico para desobstrução renal direita (cateter duplo J/nefrostomia).	0		1,0
RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS DO PACIENTE			
11. Explica, com linguagem clara, as hipóteses diagnósticas para o paciente simulado. Adequado: explica sobre a uropatia obstrutiva/litíase urinária e sobre a infecção urinária. Parcialmente adequado: explica um dos diagnósticos. Inadequado: não fornece explicações ao paciente simulado.	0	0,5	1,0
12. Orienta o paciente sobre a necessidade de internação hospitalar imediata.	0		0,75
13. Orienta o paciente sobre a gravidade do quadro, com risco de sepse de origem urinária e óbito.	0		0,75

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Apresenta-se à mãe simulada (1), pergunta nome da mãe (2) e nome da criança (3). Adequado: realiza os três procedimentos. Parcialmente adequado: realiza apenas um dos procedimentos. Inadequado: não realiza nenhum dos procedimentos.	0,0	0,25	0,5
2. Pergunta o motivo da consulta ou queixa principal.	0,0		0,25
3. Pergunta sobre a história da doença atual.	0,0		0,25
4. Pergunta sobre antecedentes gestacionais: gestações prévias, abortos e partos anteriores (1) e sobre o parto da criança (2). Adequado: pergunta sobre os dois itens. Parcialmente adequado: pergunta sobre um dos itens. Inadequado: não pergunta nenhum dos itens.	0,0	0,12	0,25
5. Pergunta sobre a amamentação (1), doenças prévias (2) e vacinas (3). Adequado: pergunta sobre os três itens. Parcialmente adequado: pergunta sobre um ou dois itens. Inadequado: não pergunta sobre nenhum dos itens.	0,0	0,12	0,25
6. Pergunta sobre padrão de urina e fezes.	0,0		0,5
7. Pede para realizar o exame físico.	0,0		0,5
8. Pede para realizar o toque retal.	0,0		1,5
9. Formula a hipótese diagnóstica (1) e explica para a mãe a doença (2). Adequado: formula a hipótese diagnóstica correta (Invaginação intestinal) e explica para a mãe, com linguagem clara, o que é. Parcialmente adequado: apenas formula a hipótese diagnóstica correta (Invaginação intestinal), sem explicá-la à mãe. Inadequado: não faz nenhum dos itens acima, ou formula hipótese diagnóstica errada.	0,0	1,0	2,0
10. Solicita ultrassonografia para confirmação diagnóstica e explica o porquê. Adequado: solicita a ultrassonografia e explica para a mãe, em linguagem clara, o porquê desse exame. Parcialmente adequado: solicita apenas a ultrassonografia. Inadequado: não solicita ou solicita outro exame qualquer.	0,0	1,0	2,0
11. Informa a mãe da conduta a ser adotada após a confirmação diagnóstica: inicialmente a tentativa de redução hidrostática por	0,0	1,0	2,0

2021-Reaplicação

ESTAÇÕES 3 e 8

AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Área: Pediatria

via retal sob radioscopia (1) e, se não for possível, o tratamento cirúrgico (2).

Adequado: informa os dois itens.

Parcialmente adequado: informa apenas um dos itens.

Inadequado: não informa nenhum dos itens ou informa a conduta errada.

--	--	--

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p>1. Cumprimenta a paciente (1), fala seu nome (2) e pergunta o nome da paciente (3). Adequado: realiza os 3 comandos. Parcialmente adequado: realiza 1 ou 2 comandos. Inadequado: não realiza nenhum dos comandos.</p>	0	0,15	0,3
<p>2. Pergunta sobre características do sintoma: prurido (1), aspecto (2), cor (3), se teve alteração urinária (4), febre (5), presença de lesões externas (6), odor (7). Adequado: questiona pelo menos 4 dos itens acima. Parcialmente adequado: questiona 2 ou 3 dos itens acima. Inadequado: questiona apenas 1 item ou nenhum.</p>	0	0,5	1,0
<p>3. Pergunta sobre vida sexual (1) ou uso de métodos contraceptivos (2). Adequado: pergunta pelo menos sobre um dos temas. Inadequado: não pergunta sobre nenhum tema.</p>	0		1,0
<p>4. Solicita o exame físico adequado: Adequado: refere que vai fazer o exame ginecológico avaliando apenas a vulva ou fazendo apenas uma inspeção. Inadequado: cita que irá fazer exame especular ou toque vaginal na paciente .</p>	0		1,5
<p>5. Solicita a presença de uma técnica de enfermagem para acompanhar o exame ginecológico. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita.</p>	0		0,5
<p>6. Postura e orientação Para o(a) participante que solicitou o Exame correto: Adequado: explica não só o diagnóstico, mas orienta que não é uma IST, que tem tratamento: deixa a paciente tranquila com relação ao tratamento. Inadequado: fica inseguro e não tranquiliza a paciente.</p> <p>Para o(a) participante que solicitou o Exame incorreto: Adequado: tem uma postura acolhedora, diz que o exame físico seria importante, mas que se ela não deseja fazer o exame físico, ela tem autonomia de decisão ou conversa com a paciente explicando como seria o exame, que é algo tranquilo ou refere que, mesmo sem o exame físico, pode se basear na</p>	0		0,7

ESTAÇÕES 4 e 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

<p>história clínica para instituir tratamento, mas que o mais adequado seria examinar a paciente. Inadequado: tem postura agressiva ou fala que se ela não deixar examinar, não conseguirá tratá-la ou tem postura não amistosa com a paciente.</p>			
<p>7. Orienta hipótese diagnóstica correta e a justifica (corrimento esbranquiçado, grumoso, sem cheiro, pruriginoso). Adequado: refere que se trata de um caso de candidíase e o justifica. Parcialmente adequado: dá o diagnóstico, mas não o justifica. Inadequado: dá outro diagnóstico ou não deixa claro qual seria a principal hipótese diagnóstica.</p>	0	0,75	1,5
<p>8. Cita os diagnósticos diferenciais para o caso clínico. Adequado: informa pelo menos duas outras vulvovaginites (vaginose, tricomoníase, vaginose citolítica, vaginite por corpo estranho etc.). Parcialmente adequado: informa apenas um outro diagnóstico diferencial. Inadequado: não informa nenhum outro diagnóstico diferencial.</p>	0	0,5	1,0
<p>9. Refere o tratamento adequado: Adequado: orienta uso de antifúngico oral (aceitar a classe geral ou nomes específicos). Inadequado: informa uso de antifúngico local (pomadas vaginais) ou não informa uso de antifúngicos.</p>	0		1,0
<p>10. Informa que a cândida é um fungo presente na microbiota vaginal (1) e que fatores de risco podem predispor a proliferação exacerbada do fungo, como, por exemplo, roupas molhadas, doenças sistêmicas, hábitos higiênico-dietéticos (2). Adequado: orienta os dois pontos acima. Parcialmente adequado: orienta apenas um dos dos dois pontos. Inadequado: não informa nenhum ponto. Se o(a) participante disser que cândida é uma doença de transmissão sexual ou que tem transmissão sexual, atribuir inadequado.</p>	0	0,5	1,0
<p>11. Informa que é desnecessário realizar exame complementar para se obter o diagnóstico e o tratamento da doença (indica que o exame físico e a história clínica já são suficientes). Obs. Se o(a) participante tiver solicitado exame físico incorreto, mas orientar que anamnese e exame físico são suficientes, atribuir adequado.</p>	0		0,5

PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO			
1. Cumprimenta a paciente (1), identifica-se de maneira cordial (2), identifica a paciente (3), pergunta (4) e ouve com atenção o motivo da consulta (5). Adequado: realiza quatro ou cinco ações. Parcialmente adequado: realiza duas ou três das ações. Inadequado: realiza uma ou nenhuma das ações.	0,0	0,25	0,50
2. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta.	0,0		0,25
3. Não interrompe a fala do outro desnecessariamente.	0,0		0,25
4. Usa linguagem acessível, evitando termos técnicos de difícil compreensão.	0,0		0,25
5. Responde às perguntas da paciente.	0,0		0,25
CONHECIMENTOS E HABILIDADES EM UM ATENDIMENTO DE DEMANDA AGENDADA			
6. Pergunta sobre fatores de risco aumentado para neoplasia de mama: envelhecimento (idade > 50 anos) I. fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca precoce, nuliparidade ou primeira gravidez após os 30 anos de idade); II. história pregressa ou familiar de câncer de mama; III. uso de álcool, tabaco (o tabaco é um fator com limitada evidência de aumento do risco de câncer de mama em humanos, mas merece atenção); IV. excesso de peso, sedentarismo; V. exposição à radiação ionizante; VI. terapia de reposição hormonal (estrogênio-progesterona); Adequado: pesquisa 4 ou mais fatores de risco. Parcialmente adequado: pesquisa 2 ou 3 fatores de risco. Inadequado: pesquisa 1 ou nenhum dos fatores de risco para neoplasia de mama.	0,0	0,5	1,0
7. Pergunta sobre fatores de risco aumentado para neoplasia de colo uterino: tabagismo (1), idade (2), infecção por HPV (3). Adequado: pesquisa 2 ou mais fatores de risco. Parcialmente adequado: pesquisa 1 fator de risco. Inadequado: não realiza nenhuma pesquisa de fatores de risco para neoplasia de colo uterino.	0,0	0,50	1,0

ESTAÇÕES 5 e 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

8. Indica a realização de exame físico (Impresso 1).	0,0		0,5
9. Indica a realização de exame clínico das mamas (Impresso 2).	0,0		0,75
10. Indica a realização de exame ginecológico (Impresso 3).	0,0		0,75
11. Solicita a presença de outro profissional de saúde em sala, preferencialmente do sexo feminino, para a realização do exame clínico das mamas e exame ginecológico.	0,0		1,0
12. Interpreta adequadamente o resultado do exame clínico da mama: achados benignos e não sugestivos de neoplasia.	0,0		1,0
13. Interpreta adequadamente o resultado do exame ginecológico: achados benignos e não sugestivos de neoplasia ou de IST. Adequado: interpreta adequadamente achados benignos não sugestivos de neoplasia ou de IST. Parcialmente adequado: menciona apenas um dos achados benignos (achados benignos e não sugestivos de neoplasia ou de IST). Inadequado: não interpreta adequadamente os achados do exame, ou não interpreta os achados do exame.	0,0	0,5	1,0
14. Plano de seguimento adequado para Papanicolau: retorno em 3 anos se achados benignos/normais.	0,0		0,75
15. Plano de seguimento adequado para Mamografia: retorno em 2 anos se BI-RADS 1.	0,0		0,75