

## ESTAÇÃO 1 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p>1. (1) Apresenta-se e (2) cumprimenta a paciente simulada. <b>Adequado:</b> realiza as duas ações. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma ação. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhuma das ações.</p>	0	0,25	0,5
<p>2. Realiza anamnese, perguntando sobre as características da diarreia: (1) frequência da diarreia; (2) número de evacuações por dia; (3) consistência das fezes; (4) presença de muco; (5) presença de sangue; (6) despertar noturno; (7) presença de alimentos não digeridos. <b>Adequado:</b> pergunta cinco ou mais características. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta apenas três ou quatro características. <b>Inadequado:</b> não pergunta ou pergunta apenas duas ou menos características.</p>	0	0,75	1,5
<p>3. Pergunta manifestações clínicas associadas ao quadro: (1) febre; (2) perda de peso; (3) anorexia; (4) artralgia; (5) dor abdominal; (6) distensão abdominal; (7) fadiga; (8) sinais sugestivos de anemia. <b>Adequado:</b> pergunta cinco ou mais características. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta apenas três ou quatro características. <b>Inadequado:</b> não pergunta ou pergunta apenas duas ou menos características.</p>	0	0,25	0,5
<p>4. Solicita exame físico. <b>Adequado:</b> solicita. <b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		0,5
<p>5. Solicita exames laboratoriais. <b>Adequado:</b> solicita. <b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		1,0
<p>6. Solicita colonoscopia e o resultado da biópsia. <b>Adequado:</b> solicita ambos. <b>Parcialmente adequado:</b> solicita apenas a colonoscopia. <b>Inadequado:</b> não solicita nenhum dos dois.</p>	0	1,5	2,0
<p>7. Estabelece o diagnóstico de retocolite ulcerativa (RCUI). <b>Adequado:</b> estabelece o diagnóstico de RCUI. <b>Parcialmente adequado:</b> não estabelece o diagnóstico de RCUI, mas estabelece o diagnóstico de doença de Crohn. <b>Inadequado:</b> lista qualquer outro diagnóstico que não seja doença inflamatória intestinal (que não seja RCUI, nem doença de Crohn).</p>	0	0,5	2,0
<p>8. Prescreve tratamento específico para retocolite ulcerativa de intensidade leve a moderada. <b>Adequado:</b> propõe somente derivados do 5-ASA (mesalazina ou sulfasalazina) <b>OU</b> propõe derivados do 5-ASA (mesalazina ou sulfasalazina) com corticoide via oral. <b>Inadequado:</b> não propõe o tratamento adequado conforme os esquemas mencionados ou propõe só o corticoide via oral.</p>	0		2,0

## ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p>1. Identifica-se e identifica adequadamente o paciente. <b>Adequado:</b> realiza todos os comandos. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza somente um comando. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhum dos comandos.</p>	0	0,25	0,5
<p>2. Pergunta sobre as características do sangramento: (1) aspecto; (2) intensidade; (3) frequência; (4) duração. <b>Adequado:</b> pergunta sobre todas as características. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta apenas duas ou três características. <b>Inadequado:</b> pergunta apenas uma ou não pergunta nenhuma das características.</p>	0	0,5	1,0
<p>3. Realiza anamnese, perguntando sobre sintomas associados – <u>digestivos</u>: (1) ritmo intestinal; (2) dor tipo cólica; (3) distensão abdominal; (4) tenesmo; e <u>consumptivos</u>: (5) perda de peso; (6) astenia; (7) anorexia. <b>Adequado:</b> pergunta sobre todas as possibilidades (4 sintomas digestivos e 3 sintomas consumptivos). <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta apenas dois ou três sintomas digestivos e apenas dois sintomas consumptivos. <b>Inadequado:</b> não pergunta nenhum dos itens ou somente um dos sintomas consumptivos e/ou um dos sintomas digestivos.</p>	0	0,5	1,0
<p>4. Solicita a realização do exame físico: (1) exame físico geral; e (2) exame proctológico. <b>Adequado:</b> solicita a realização dos dois exames. <b>Parcialmente adequado:</b> solicita a realização de apenas um dos exames. <b>Inadequado:</b> não solicita a realização de nenhum dos exames físicos.</p>	0	0,75	1,5
<p>5. Solicita exames complementares laboratoriais como plano diagnóstico (especifica pelo menos o hemograma). <b>Adequado:</b> solicita. <b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		0,5
<p>6. Solicita a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia. <b>Adequado:</b> solicita a colonoscopia. <b>Parcialmente adequado:</b> solicita a retossigmoidoscopia. <b>Inadequado:</b> não solicita colonoscopia nem retossigmoidoscopia.</p>	0	0,75	1,5
<p>7. Solicita o resultado da biópsia. <b>Adequado:</b> solicita. <b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		0,5

## ESTAÇÃO 2 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Cirurgia Geral

<p><b>8.</b> Interpreta de maneira adequada o caso, fazendo o diagnóstico do sangramento retal: (1) câncer colorretal; e (2) doença hemorroidária.</p> <p><b>Adequado:</b> identifica as duas causas de sangramento retal.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> dá somente o diagnóstico de câncer.</p> <p><b>Inadequado:</b> não dá o diagnóstico de câncer ou dá somente o diagnóstico de hemorroida.</p>	0	0,5	1,0
<p><b>9.</b> Solicita os exames de estadiamento/imagem: (1) TC de tórax; (2) TC de abdome total, ou TC de abdome superior e TC de pelve, ou TC de abdome superior e RM de pelve; (3) CEA.</p> <p><b>Adequado:</b> solicita os três itens corretamente.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> solicita apenas 1 exame de imagem, com ou sem o CEA.</p> <p><b>Inadequado:</b> não solicita nenhum item de imagem, ou só solicita o CEA, ou solicita apenas o PET TC.</p> <p>*PET TC não faz parte de exames de rotina para estadiamento.</p>	0	0,25	0,5
<p><b>10.</b> Explica sobre a potencial gravidade do quadro.</p> <p><b>Adequado:</b> explica.</p> <p><b>Inadequado:</b> não explica.</p>	0		0,5
<p><b>11.</b> Indica tratamento do câncer colorretal.</p> <p><b>Adequado:</b> indica cirurgia.</p> <p><b>Inadequado:</b> não indica nenhum tratamento adequado ou somente indica tratamento para a doença hemorroidária.</p>	0		1,0
<p><b>12.</b> Explica que, após a cirurgia, o paciente poderá precisar de tratamento complementar (adjuvante).</p> <p><b>Adequado:</b> fala sobre a possibilidade de quimioterapia.</p> <p><b>Inadequado:</b> não fala sobre o assunto.</p>	0		0,5

## ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p>1. Apresenta-se à paciente simulada e pergunta o seu nome. <b>Adequado:</b> realiza as duas ações. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma das ações. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhuma das ações.</p>	0	0,25	0,5
<p>2. Realiza anamnese, perguntando sobre: (1) motivo da consulta; (2) outros sinais e sintomas relacionados à queixa principal; (3) sintomas digestivos; (4) sintomas urinários; (5) menarca; (6) alimentação; (7) doenças anteriores; (8) histórico familiar. <b>Adequado:</b> investiga 6 ou mais elementos, sendo a exploração da queixa principal obrigatória. <b>Parcialmente adequado:</b> investiga de 4 a 5 elementos apenas, sendo a exploração da queixa principal obrigatória. <b>Inadequado:</b> investiga menos de 4 elementos.</p>	0	0,75	1,5
<p>3. Solicita exame físico geral e formula hipótese diagnóstica. <b>Adequado:</b> interpreta o exame físico e estabelece o diagnóstico etiológico de apendicite aguda. <b>Inadequado:</b> não solicita o exame físico, ou não estabelece o diagnóstico etiológico de apendicite aguda.</p>	0		1,0
<p>4. Analisa a radiografia: (1) níveis líquidos em fossa ilíaca direita; (2) borramento da borda do músculo psoas; (3) distensão de alças intestinais; 4. escoliose antálgica. <b>Adequado:</b> cita todos os itens. <b>Parcialmente adequado:</b> cita de 2 a 3 itens apenas. <b>Inadequado:</b> cita apenas 1 ou nenhum item.</p>	0	0,75	1,5
<p>5. Solicita e interpreta o hemograma. <b>Adequado:</b> solicita hemograma e o interpreta como de padrão infeccioso. <b>Parcialmente adequado:</b> solicita o hemograma, mas não o interpreta. <b>Inadequado:</b> não solicita hemograma ou o solicita, mas interpreta que está tudo normal.</p>	0	0,5	1,0
<p>6. Solicita e interpreta o exame de urina. <b>Adequado:</b> solicita e interpreta o exame de urina como normal. <b>Parcialmente adequado:</b> solicita o exame de urina, mas não o interpreta. <b>Inadequado:</b> não solicita o exame de urina.</p>	0	0,5	1,0
<p>7. Após análise de exames complementares, confirma o diagnóstico. <b>Adequado:</b> Confirma o diagnóstico de apendicite aguda. <b>Inadequado:</b> Não confirma o diagnóstico ou formula outro diagnóstico qualquer.</p>	0		1,5

## ESTAÇÃO 3 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

8. Proposta terapêutica: (1) explica o que é a apendicite aguda e (2) que a paciente deve ser encaminhada para um cirurgião pediátrico, indicando cirurgia de urgência.

**Adequado:** realiza os dois itens corretamente.

**Parcialmente adequado:** realiza apenas um dos itens corretamente.

**Inadequado:** não realiza nenhum dos itens corretamente.

0

1,0

2,0

## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p>1. Apresentação: (1) cumprimenta e (2) se apresenta à paciente simulada. <b>Adequado:</b> realiza os dois itens. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas um dos itens. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhuma dos itens.</p>	0	0,125	0,25
<p>2. Pergunta sobre: (1) características da dor; (2) febre; e (3) vômitos. <b>Adequado:</b> pergunta sobre dois ou três sintomas. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta sobre apenas um sintoma. <b>Inadequado:</b> não pergunta sobre nenhum sintoma.</p>	0	0,25	0,5
<p>3. Pergunta sobre anticoncepção. <b>Adequado:</b> pergunta sobre anticoncepção. <b>Inadequado:</b> não pergunta sobre anticoncepção.</p>	0		0,25
<p>4. Pergunta a data da última menstruação. <b>Adequado:</b> pergunta a data da última menstruação. <b>Inadequado:</b> não pergunta a data da última menstruação.</p>	0		1,0
<p>5. Solicita teste de gravidez. <b>Adequado:</b> solicita teste de gravidez. <b>Inadequado:</b> não solicita teste de gravidez.</p>	0		1,0
<p>6. Verbaliza corretamente a manobra de descompressão brusca abdominal (compressão seguida de descompressão). <b>Adequado:</b> verbaliza a manobra. <b>Inadequado:</b> não verbaliza a manobra ou verbaliza incorretamente.</p>	0		1,0
<p>7. Refere a necessidade de realizar exame ginecológico (ou exame de toque vaginal ou exame especular). <b>Adequado:</b> refere a necessidade de realizar o exame. <b>Inadequado:</b> não refere a necessidade do exame.</p>	0		0,5
<p>8. Realiza o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. <b>Adequado:</b> realiza o diagnóstico correto. <b>Inadequado:</b> menciona outras hipóteses diagnósticas, ou não realiza o diagnóstico, ou não identifica como diagnóstico a doença inflamatória pélvica.</p>	0		1,25
<p>9. Cita os diagnósticos diferenciais mais importantes: (1) apendicite; (2) gestação ectópica; (3) cisto de ovário roto; e (4) torção ovariana. <b>Adequado:</b> cita corretamente dois ou mais diagnósticos diferenciais. <b>Parcialmente adequado:</b> cita corretamente apenas um diagnóstico diferencial. <b>Inadequado:</b> cita outros diagnósticos diferenciais ou não cita nenhum diagnóstico diferencial.</p>	0	0,5	1,0

## ESTAÇÃO 4 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

<p><b>10.</b> Indica internação hospitalar (1) e a justifica corretamente, citando peritonite e/ou abscesso tubo-ovariano (2). <b>Adequado:</b> realiza as duas tarefas. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas a indicação, sem justificar. <b>Inadequado:</b> não indica a internação.</p>	0	0,5	1,0
<p><b>11.</b> Orienta tratamento com antibiótico endovenoso. <b>Adequado:</b> orienta o tratamento com antibiótico endovenoso. <b>Inadequado:</b> não orienta o tratamento com antibiótico endovenoso ou orienta o tratamento com antibiótico por via oral.</p>	0		0,25
<p><b>12.</b> Orienta o tratamento do parceiro sexual. <b>Adequado:</b> orienta o tratamento. <b>Inadequado:</b> não orienta o tratamento.</p>	0		0,25
<p><b>13.</b> Refere complicações futuras que podem ocorrer com a paciente: (1) infertilidade; (2) sinequias intrauterinas; (3) dor pélvica crônica; e (4) gravidez ectópica. <b>Adequado:</b> refere corretamente duas ou mais complicações. <b>Parcialmente adequado:</b> refere apenas uma complicação. <b>Inadequado:</b> refere outras complicações ou não refere nenhuma complicação.</p>	0	0,25	0,5
<p><b>14.</b> Refere a necessidade de realização de exames para outras ITS/ISTs/DSTs. <b>Adequado:</b> refere a necessidade de realização de exame(s) para ITS/ISTs/DSTs. <b>Inadequado:</b> não refere a necessidade de realização de exame(s).</p>	0		1,0
<p><b>15.</b> Orienta, como medida de prevenção, o uso de preservativo e refere que a multiplicidade de parceiros é um fator de risco. <b>Adequado:</b> orienta sobre o uso de preservativos e refere o número de parceiros como fator de risco. <b>Parcialmente adequado:</b> apenas orienta sobre o uso de preservativos ou apenas refere o número de parceiros como fator de risco. <b>Inadequado:</b> não orienta sobre o uso de preservativos e não refere o número de parceiros como fator de risco.</p>	0	0,125	0,25

## ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<b>HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>			
<p>1. (1) Cumprimenta o paciente simulado; (2) identifica-se; (3) dirige-se ao paciente simulado pelo nome, pelo menos uma vez; (4) pergunta e (5) ouve com atenção o motivo da consulta.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza as cinco ações. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza de duas a quatro ações. <b>Inadequado:</b> realiza apenas uma ação ou não realiza nenhuma ação.</p>	0,0	0,25	0,5
<p>2. Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza as duas ações. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma das ações. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhuma das ações.</p>	0,0	0,15	0,25
<p>3. Escuta a fala do paciente simulado, sem interrompê-lo.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza integralmente a ação. <b>Inadequado:</b> não realiza a ação ou não a realiza integralmente.</p>	0,0		0,25
<p>4. Usa linguagem acessível para com o paciente simulado, evitando termos técnicos de difícil compreensão.</p> <p><b>Adequado:</b> usa linguagem acessível. <b>Inadequado:</b> não utiliza linguagem acessível.</p>	0,0		0,25
<p>5. Responde às perguntas do paciente simulado.</p> <p><b>Adequado:</b> responde as perguntas. <b>Inadequado:</b> não responde as perguntas.</p>	0,0		0,25
<b>DIAGNÓSTICO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO-LABORATORIAL</b>			
<p>6. Pergunta sobre o contexto socioepidemiológico do paciente simulado: (1) residência em área de provável transmissão da doença; (2) existência de coabitantes e vizinhos com lesão semelhante; (3) presença de animais no domicílio e no peridomicílio.</p> <p><b>Adequado:</b> pergunta sobre os três itens especificados. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta sobre apenas dois dos itens especificados. <b>Inadequado:</b> pergunta sobre apenas um dos itens especificados ou não pergunta nenhum dos itens especificados.</p>	0,0	1,0	1,5
<p>7. Descreve as características da lesão: (1) úlcera única, (2) bordas definidas; e (3) indolor.</p> <p><b>Adequado:</b> descreve as três características especificadas. <b>Parcialmente adequado:</b> descreve apenas duas das características especificadas. <b>Inadequado:</b> não descreve nenhuma das características especificadas.</p>	0,0	0,50	1,0



## ESTAÇÃO 5 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

<p>8. Pergunta sobre a existência de lesão em mucosas (boca ou nariz). <b>Adequado:</b> pergunta se há lesão em mucosas (boca ou nariz). <b>Inadequado:</b> não pergunta sobre lesões em mucosas.</p>	0,0		0,5
<p>9. Realiza o diagnóstico clínico-epidemiológico <b>Adequado:</b> estabelece o diagnóstico clínico-epidemiológico de <i>Leishmaniose tegumentar</i>. <b>Parcialmente adequado:</b> Suspeita de <i>Leishmaniose tegumentar</i>, mas diz que só pode estabelecer o diagnóstico diante dos exames complementares para pesquisa de <i>Leishmania</i>: parasitológico, molecular, imunológico ou histopatológico. <b>Inadequado:</b> não estabelece diagnóstico de leishmaniose.</p>	0,0	0,75	1,5
<b>PLANO TERAPÊUTICO, DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DE TRABALHO EM EQUIPE</b>			
<p>10. Solicita: (1) prova da função renal (2) prova da função hepática; e (3) eletrocardiograma antes de iniciar a farmacoterapia. <b>Adequado:</b> solicita os três exames. <b>Inadequado:</b> não solicita os três exames.</p>	0,0		0,5
<p>11. Indica o tratamento com antimonial pentavalente (não é necessário dizer a dose). <b>Adequado:</b> indica o tratamento correto. <b>Inadequado:</b> não indica o tratamento correto.</p>	0,0		1,0
<p>12. Notifica o caso de leishmaniose tegumentar. <b>Adequado:</b> notifica o caso. <b>Inadequado:</b> não notifica o caso.</p>	0,0		1,0
<p>13. Indica a necessidade de abordagem comunitária: (1) avaliação de novos casos pelo agente comunitário de saúde (ACS); (2) atuação do agente de combate de endemias (ACE)/zoonose. <b>Adequado:</b> indica a atuação dos dois agentes. <b>Parcialmente adequado:</b> indica a atuação de apenas um dos agentes. <b>Inadequado:</b> não indica a atuação de nenhum dos agentes.</p>	0,0	0,50	0,75
<p>14. Explica as medidas de prevenção e controle: (1) usar repelentes; (2) evitar a exposição ao mosquito no anoitecer e à noite; (3) usar mosquiteiros ou telas; (4) limpar quintais e terrenos; (5) fazer a destinação correta do lixo; (6) limpar os abrigos de animais domésticos; (7) manter os animais domésticos distantes do intradomicílio à noite. <b>Adequado:</b> explica três ou mais das medidas especificadas. <b>Parcialmente adequado:</b> explica apenas duas das medidas especificadas. <b>Inadequado:</b> explica apenas uma medida ou não explica nenhuma das medidas especificadas.</p>	0,0	0,25	0,75

## ESTAÇÃO 6 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Clínica Médica

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p>1. Cumprimenta o paciente, (1) apresentando-se e (2) perguntando os dados do paciente. <b>Adequado:</b> realiza os dois itens. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas um item. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhum item.</p>	0	0,25	0,5
<p>2. Realiza anamnese. Questiona sobre: (1) características da dor e (2) Febre ou calafrios. <b>Adequado:</b> Questiona os dois itens. <b>Parcialmente adequado:</b> Questiona apenas um item. <b>Inadequado:</b> Não questiona nenhum dos itens.</p>	0	0,5	1,0
<p>3. Pergunta sobre antecedentes pessoais e familiares: (1) ingestão de bebida alcoólica, (2) medicamentos, (3) dieta hiperproteica, (4) trauma, (5) episódio prévio de artrite em articulação ou articulações MMII, (6) síndrome metabólica (diabetes, hipertensão, dislipidemia), (7) história familiar de doença semelhante. <b>Adequado:</b> pergunta 5 ou mais itens. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta apenas 3 ou 4 itens. <b>Inadequado:</b> pergunta apenas 2 ou menos itens.</p>	0	1,0	2,0
<p>4. Interpreta exames laboratoriais. <b>Adequado:</b> identifica hiperuricemia. <b>Inadequado:</b> não identifica hiperuricemia.</p>	0		1,0
<p>5. Solicita exames de imagem: radiografia de tornozelo e/ou pé, ou ecografia do tornozelo esquerdo. <b>Adequado:</b> solicita um dos exames. <b>Inadequado:</b> não solicita nenhum dos exames.</p>	0		1,0
<p>6. Hipótese diagnóstica. <b>Adequado:</b> cita o diagnóstico de artrite por gota. <b>Parcialmente adequado:</b> cita um dos diagnósticos diferenciais (artrite séptica, celulite ou erisipela), sem citar gota. <b>Inadequado:</b> não cita nenhum dos diagnósticos mencionados.</p>	0	1,0	2,0
<p>7. Proposta medicamentosa para tratamento inicial: uso de anti-inflamatórios não esteroidais e/ou corticoide e/ou colchicina. <b>Adequado:</b> cita pelo menos uma das opções. <b>Inadequado:</b> não cita nenhuma das opções.</p>	0		1,5
<p>8. Proposta terapêutica para estilo de vida após a crise aguda: (1) orientação dietética (restringir sódio, carne vermelha, embutidos, frutos do mar e bebida alcoólica); e (2) recomendação de atividade física regular. <b>Adequado:</b> propõe as duas orientações. <b>Parcialmente adequado:</b> propõe uma das orientações apenas. <b>Inadequado:</b> não propõe orientações.</p>	0	0,5	1,0

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<p>1. Identifica-se e identifica adequadamente a paciente. <b>Adequado:</b> realiza os dois comandos. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza somente um comando. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhum dos comandos.</p>	0	0,2	0,5
<p>2. Pergunta sobre as características do acidente: (1) local; (2) tempo de exposição; (3) inalação de fumaça; e (4) agente. <b>Adequado:</b> pergunta sobre todos os itens. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta sobre apenas dois ou três itens. <b>Inadequado:</b> pergunta apenas sobre um item ou não pergunta nenhum dos itens.</p>	0	0,2	0,5
<p>3. Solicita a realização de exame dos sinais vitais, indicando: (1) PA; (2) FC; (3) FR; e (4) oximetria. <b>Adequado:</b> solicita a necessidade de realização do exame dos sinais vitais, indicando todos os itens. <b>Parcialmente adequado:</b> solicita a necessidade de realização do exame, indicando apenas dois ou três itens. <b>Inadequado:</b> solicita a necessidade de realização do exame, indicando apenas um item, ou não solicita a necessidade do exame.</p>	0	0,5	1,0
<p>4. Indica oxigenoterapia após verificar os sinais vitais. <b>Adequado:</b> indica a oxigenoterapia. <b>Inadequado:</b> não indica oxigenoterapia.</p>	0		1,0
<p>5. Solicita a realização do exame físico do aparelho respiratório, descrevendo pelo menos a inspeção ou ausculta pulmonar. <b>Adequado:</b> solicita o exame adequadamente. <b>Inadequado:</b> não solicita o exame.</p>	0		1,0
<p>6. Indica a entubação orotraqueal. <b>Adequado:</b> faz a indicação. <b>Inadequado:</b> não faz a indicação.</p>	0		1,25
<p>7. Verbaliza a necessidade de realização do exame físico para avaliar a superfície corporal queimada. <b>Adequado:</b> verbaliza a necessidade de realização do exame físico, citando a retirada de toda a vestimenta e acessórios. <b>Parcialmente adequado:</b> somente verbaliza a realização do exame, sem citar a retirada da vestimenta. <b>Inadequado:</b> não verbaliza a necessidade do exame físico para avaliar a superfície corporal queimada.</p>	0	0,5	1,0
<p>8. Calcula corretamente a superfície corporal queimada, segundo a regra dos 9 (36%) e verbaliza esse resultado. <b>Adequado:</b> calcula corretamente a área queimada, verbalizando o resultado. <b>Inadequado:</b> não calcula corretamente a área queimada ou não verbaliza o resultado.</p>	0		1,0

## ESTAÇÃO 7 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Cirurgia Geral

<p><b>9.</b> Prescreve corretamente a reposição volêmica de acordo com a fórmula de Parkland. <b>Adequado:</b> 1.800 mL nas primeiras 8 horas e 1.800 mL nas 16 horas seguintes. <b>Inadequado:</b> não prescreve corretamente.</p>	0		1,25
<p><b>10.</b> Indica cobertura da área queimada com curativo oclusivo. <b>Adequado:</b> indica corretamente a cobertura da área queimada. <b>Inadequado:</b> não indica a cobertura da área queimada ou indica curativo com qualquer outro medicamento, como, por exemplo, sulfadiazina de prata, óleo de girassol, entre outros.</p>	0		0,5
<p><b>11.</b> Verbaliza a necessidade de transferência da paciente simulada para centro de referência. <b>Adequado:</b> verbaliza a necessidade de transferência. <b>Inadequado:</b> não verbaliza a necessidade de transferência.</p>	0		1,0

## ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Pediatria

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<b>Dados anamnésicos</b>			
<p>1. Identifica-se e cumprimenta a mãe, de maneira adequada e cordial.</p> <p><b>Adequado:</b> demonstra cordialidade, faz contato visual.</p> <p><b>Inadequado:</b> identifica-se, mas não cumprimenta a mãe, ou vice-versa; evita contato visual com a mãe; não demonstra empatia.</p>	0		0,5
<p>2. Solicita a Caderneta de Saúde da Criança no início da consulta.</p> <p><b>Adequado:</b> solicita.</p> <p><b>Inadequado:</b> não solicita.</p>	0		0,5
<p>3. Realiza anamnese.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pergunta detalhes sobre a queixa principal.</li> <li>Pergunta sobre outras queixas.</li> <li>Pergunta sobre antecedentes perinatais.</li> <li>Pergunta sobre a alimentação.</li> <li>Pergunta sobre o desenvolvimento neuromotor.</li> <li>Pergunta sobre o sono.</li> <li>Pergunta sobre evacuações e urina.</li> <li>Pergunta sobre medicações ou vitaminas.</li> <li>Pergunta sobre imunização.</li> <li>Pergunta sobre os Testes do Pezinho e do Coraçõzinho, e/ou da Orelhinha e/ou do Olhinho.</li> <li>Pergunta sobre antecedentes familiares.</li> <li>Investiga condições sociais/moradia.</li> </ol> <p><b>Adequado:</b> investiga de 8 a 12 elementos, sendo a exploração da queixa principal obrigatória.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> investiga de 5 a 7 elementos apenas, sendo a exploração da queixa principal obrigatória.</p> <p><b>Inadequado:</b> investiga até 4 elementos ou não pergunta sobre a queixa principal.</p>	0	0,5	1,0

## ESTAÇÃO 8 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

### Área: Pediatria

#### Dados do exame físico e da investigação clínica

<p><b>4.</b> Solicita e analisa o exame físico corretamente.</p> <p><b>Adequado:</b> solicita o exame físico e interpreta que a criança está clinicamente bem, sem sinais de alarme.</p> <p><b>Inadequado:</b> não solicita o exame físico, ou solicita-o e o interpreta de forma errada.</p>	0		1,0
<p><b>5.</b> Esclarece à mãe sobre os dados antropométricos da criança: (1) peso; (2) comprimento; (3) perímetro cefálico; e classifica todos de acordo com o Escore Z (<i>Z Score</i>) correto.</p> <p><b>Adequado:</b> esclarece à mãe sobre os 3 dados antropométricos, classificando-os corretamente de acordo com o Escore Z.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> esclarece à mãe sobre apenas 1 ou 2 dados antropométricos e os classifica de acordo com o Escore Z correto.</p> <p><b>Inadequado:</b> não esclarece à mãe sobre os dados antropométricos ou os classifica incorretamente no Escore Z.</p>	0	1,0	2,0
<p><b>6.</b> Indica a suplementação de ferro.</p> <p><b>Adequado:</b> menciona a necessidade de suplementação de ferro.</p> <p><b>Inadequado:</b> não menciona a necessidade de suplementação de ferro.</p>	0		0,5
<p><b>7.</b> Indica a suplementação de vitamina D.</p> <p><b>Adequado:</b> menciona a necessidade de suplementação de vitamina D.</p> <p><b>Inadequado:</b> não menciona a necessidade de suplementação de vitamina D.</p>	0		0,5
<p><b>8.</b> Sobre a queixa principal da genitora: (1) reconhece as regurgitações da lactente como evento fisiológico - refluxo gastroesofágico fisiológico, refluxo funcional, regurgitador feliz, bebê regurgitador, vômitos inocentes, bebê golfador - de ocorrência natural no desenvolvimento da criança, sem maiores repercussões; e (2) esclarece à mãe o diagnóstico.</p> <p><b>Adequado:</b> realiza os dois itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> realiza o item 1, mas não esclarece o item 2.</p> <p><b>Inadequado:</b> não realiza o item 1, ou fornece outro diagnóstico.</p>	0	1,0	2,0
<p><b>9.</b> Orienta sobre a propedêutica/terapêutica para as regurgitações apresentadas:</p> <p>(1) atitudes conservadoras (postura, esperar o bebê arrotar antes de deitar); (2) desnecessário medicação ou exame propedêutico.</p> <p><b>Adequado:</b> orienta os dois itens.</p> <p><b>Parcialmente adequado:</b> orienta apenas o item 1.</p> <p><b>Inadequado:</b> orienta apenas o item 2 ou orienta errado.</p>	0	1,0	2,0

## ESTAÇÃO 9 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS Área: Ginecologia e Obstetrícia

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
1. Apresentação: cumprimenta e se apresenta à paciente simulada. <b>Adequado:</b> cumprimenta a paciente simulada e se apresenta. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma das atividades. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhuma das duas atividades.	0	0,25	0,5
2. Pergunta sobre os sintomas de dor e sangramento, como: (1) início e duração; (2) características da dor; e (3) aspecto do sangramento. <b>Adequado:</b> pergunta sobre dois ou mais sintomas. <b>Parcialmente adequado:</b> pergunta sobre apenas um dos sintomas. <b>Inadequado:</b> não pergunta sobre as características dos sintomas de dor e sangramento.	0	0,5	1,0
3. Pergunta sobre os movimentos fetais. <b>Adequado:</b> pergunta sobre os movimentos fetais. <b>Inadequado:</b> não pergunta sobre os movimentos fetais.	0		0,5
4. Pergunta sobre o tempo de gestação (ou data da última menstruação). <b>Adequado:</b> pergunta. <b>Inadequado:</b> não pergunta.	0		0,5
5. Solicita o cartão de pré-natal. <b>Adequado:</b> solicita o cartão de pré-natal. <b>Inadequado:</b> não solicita o cartão de pré-natal.	0		0,5
6. Indica a necessidade de realizar o exame obstétrico abdominal. <b>Adequado:</b> indica a necessidade de exame obstétrico abdominal. <b>Inadequado:</b> não indica o exame obstétrico abdominal.	0		0,5
7. Indica a necessidade de realizar exame ginecológico (ou toque vaginal ou exame especular). <b>Adequado:</b> indica a necessidade de realizar o exame. <b>Inadequado:</b> não indica a realização do exame.	0		0,5
8. Cita descolamento prematuro de placenta e sofrimento fetal agudo como diagnósticos. <b>Adequado:</b> cita os dois diagnósticos. <b>Parcialmente adequado:</b> cita apenas um dos diagnósticos. <b>Inadequado:</b> não cita nenhum dos diagnósticos.	0	1,0	2,0
9. Cita diagnósticos diferenciais, como: (1) placenta prévia; (2) ruptura de seio marginal; e (3) rotura de vasa prévia. <b>Adequado:</b> cita dois ou mais diagnósticos diferenciais. <b>Parcialmente adequado:</b> cita até um diagnóstico diferencial. <b>Inadequado:</b> não cita nenhum dos diagnósticos diferenciais.	0	0,5	1,0
10. Indica a necessidade imediata de interrupção da gravidez (cesariana de urgência). <b>Adequado:</b> indica a interrupção da gravidez (cesariana de urgência). <b>Inadequado:</b> não indica interrupção da gravidez (cesariana de urgência).	0		2,0
11. Orienta a mãe sobre o (1) risco fetal e (2) a necessidade de internação na UTI neonatal. <b>Adequado:</b> realiza as duas orientações. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma orientação. <b>Inadequado:</b> não orienta a paciente ou a orienta incorretamente.	0	0,5	1,0

## ESTAÇÃO 10 | AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

### PADRÃO ESPERADO DE PROCEDIMENTOS - Preliminar

ITENS DE DESEMPENHO AVALIADOS	DESEMPENHO OBSERVADO		
	Inadequado	Parcialmente adequado	Adequado
<b>COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO</b>			
<p><b>1.</b> (1) Cumprimenta a paciente simulada; (2) identifica-se; (3) dirige-se à paciente simulada pelo nome, pelo menos uma vez; (4) pergunta e (5) ouve com atenção o motivo da consulta. <b>Adequado:</b> realiza as cinco ações. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza duas a quatro ações. <b>Inadequado:</b> realiza apenas uma ação ou não realiza nenhuma ação.</p>	0,0	0,25	0,50
<p><b>2.</b> Estabelece contato visual e mantém postura empática ao longo da consulta. <b>Adequado:</b> realiza as duas ações. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas uma das ações. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhuma das ações.</p>	0,0	0,15	0,25
<p><b>3.</b> Escuta a fala da paciente simulada, sem interrompê-la. <b>Adequado:</b> realiza integralmente a ação. <b>Inadequado:</b> não realiza integralmente a ação.</p>	0,0		0,25
<p><b>4.</b> Usa linguagem acessível para com a paciente simulada, evitando termos técnicos de difícil compreensão. <b>Adequado:</b> usa linguagem acessível. <b>Inadequado:</b> não utiliza linguagem acessível.</p>	0,0		0,25
<p><b>5.</b> Evita atitude paternalista (condescendente) e “alarmista”. <b>Adequado:</b> evita as duas atitudes. <b>Inadequado:</b> assume qualquer uma das duas atitudes.</p>	0,0		0,25
<b>ABORDAGEM CLÍNICA</b>			
<p><b>6.</b> Investiga o histórico de saúde da paciente simulada: (1) antecedentes de ansiedade e depressão; (2) uso de outras drogas; (3) uso de medicamentos; (4) presença de sintomas respiratórios; (5) realização de atividades físicas; (6) uso de métodos anticoncepcionais. <b>Adequado:</b> investiga quatro ou mais características. <b>Parcialmente adequado:</b> investiga duas a três características apenas. <b>Inadequado:</b> investiga apenas uma ou nenhuma das características mencionadas.</p>	0,0	0,50	1,0
<p><b>7.</b> Investiga a motivação para a cessação do tabagismo e verbaliza o grau de motivação (contemplação/preparação para ação) da paciente simulada. <b>Adequado:</b> realiza os dois procedimentos. <b>Parcialmente adequado:</b> realiza apenas um procedimento. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhum dos procedimentos mencionados.</p>	0,0	0,75	1,50



## ESTAÇÃO 10

## AVALIAÇÃO DE HABILIDADES CLÍNICAS

Área: Medicina de Família e Comunidade – Saúde Coletiva

<p>8. Avalia o grau de dependência nicotínica: (1) aplica o teste de Fagerström; (2) identifica e (3) interpreta o grau de dependência da paciente simulada. <b>Adequado:</b> realiza os três procedimentos. <b>Parcialmente adequado:</b> aplica o teste, mas não cumpre ou cumpre parcialmente os demais procedimentos mencionados. <b>Inadequado:</b> não realiza nenhum dos procedimentos mencionados.</p>	0,0	0,75	1,50
<b>ABORDAGEM TERAPÊUTICA, DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DE TRABALHO EM EQUIPE</b>			
<p>9. Informa os benefícios para a cessação do tabagismo: (1) melhora do hálito e/ou do odor corporal; (2) redução da pressão arterial; (3) melhora do olfato; (4) melhora do paladar; (5) diminuição do risco de infarto; (6) diminuição do risco de câncer. <b>Adequado:</b> informa quatro ou mais benefícios. <b>Parcialmente adequado:</b> informa de dois a três benefícios apenas. <b>Inadequado:</b> informa apenas um ou nenhum dos benefícios.</p>	0,0	0,50	1,0
<p>10. Convida a paciente simulada para participar de atividade em grupo de cessação de tabagismo na UBS. <b>Adequado:</b> faz o convite <b>Inadequado:</b> não faz o convite.</p>	0,0		1,0
<p>11. Recomenda medidas não farmacológicas à paciente simulada: (1) fazer atividade física; (2) ter alimentação saudável; (3) fazer atividades que evitem o ganho de peso nesta fase; e (4) evitar situações estressantes. <b>Adequado:</b> recomenda três ou mais ações. <b>Parcialmente adequado:</b> recomenda uma ou duas ações. <b>Inadequado:</b> não faz nenhuma das recomendações mencionadas.</p>	0,0	0,25	0,5
<p>12. (1) Indica o tratamento medicamentoso disponível no SUS (Bupropiona, adesivos de nicotina ou goma de nicotina) e (2) orienta sobre possíveis efeitos adversos da medicação, como, por exemplo: 1. boca seca; 2. insônia; 3. tontura; 4. cefaleia; 5. aumento da PA; 6. dispepsia; 7. náuseas e vômitos; 8. enxaqueca; 9. dor abdominal; 10. constipação; 11. irritação na pele; e 12. manchas nos dentes. Observação: para pontuar no primeiro item basta indicar um dos medicamentos; para pontuar no segundo item (efeitos adversos), o(a) participante deve mencionar pelo menos 2 dos efeitos adversos mencionados. <b>Adequado:</b> faz as duas indicações. <b>Parcialmente adequado:</b> faz uma das indicações apenas. <b>Inadequado:</b> não faz nenhuma das indicações.</p>	0,0	1,00	2,0