

Questão MPSoci0_05

Dona Elisa, 50 anos, portadora de transtorno bipolar, retornou para consulta na UBS com exames laboratoriais relacionados à tireoide alterados após iniciar uso de medicamento. Nesse caso, o médico da família deve então reavaliar o uso de

- (A) carbonato de lítio.
- (B) carbamazepina.
- (C) divalproato de sódio.
- (D) fumarato de quetiapina.
- (E) haloperidol.

Questão MPSoci0_06

Dr. Antônio atende na UBS uma paciente de 34 anos com queixa de poliartralgias a qual traz resultado de exames que demonstram anemia, linfopenia e fator antinuclear positivo em títulos altos. Ao fim da consulta, o médico prescreve hidroxicloroquina para ela. Devido a essa prescrição, Dr. Antônio deve encaminhá-la para avaliação do

- (A) cardiologista.
- (B) nefrologista.
- (C) hepatologista.
- (D) oftalmologista.
- (E) hematologista.

Questão Pediat_06

As infecções sexualmente transmissíveis são um grave problema de saúde pública no Brasil, devendo-se ter especial atenção à população adolescente. Considerando somente as infecções adquiridas, qual, das seguintes, pode ser transmitida de outras formas além da sexual?

- (A) Sífilis.
- (B) Hepatite B.
- (C) Gonorreia.
- (D) Linfgranuloma venéreo.
- (E) Cancro mole.

Questão Pediat_09

Sobre a rubéola congênita, assinale a alternativa correta.

- (A) Perda auditiva é a manifestação mais comum e usualmente é condutiva bilateral, e a severidade varia de moderada a grave, com progressão ao longo do tempo.
- (B) Cerca de 50% apresentam algum tipo de defeito cardíaco estrutural, sendo mais comuns os defeitos de septo cardíaco.
- (C) O risco de transmissão materno-fetal é maior nas primeiras 10 semanas de gestação, e o risco de ocorrer malformações prolonga-se até a 18ª e a 20ª semana.
- (D) As manifestações tardias de diabetes melito e das patologias da tireoide são bastante comuns, afetando mais de 1/3 dos casos até a adolescência.
- (E) O uso de imunoglobulina para tratamento da rubéola materna garante proteção contra a infecção do feto.

Questão MPSoci1_10

Gestante, 27 anos, com parto prematuro de 34 semanas gestacionais. Após alta para casa, evolui com infecção uterina, sepse e tem óbito confirmado 60 dias após o parto. Diante do exposto, qual é o tipo de morte?

- (A) Morte materna direta.
- (B) Morte obstétrica direta.
- (C) Morte não materna, pois ocorreu 60 dias após o parto.
- (D) Morte materna tardia.
- (E) Morte pós-materna.

Questão Cmed_11

Um homem de 62 anos é levado ao hospital com história de perda de força em dimídio direito, afasia e desvio de rima labial, de início há aproximadamente 40min. Após a realização de uma tomografia computadorizada de crânio (normal, com laudo oficial do radiologista), seus sinais vitais são os seguintes:

- PA: 192x124 mmHg;
- Glicemia capilar: 88 mg/dL;
- NIHSS: 18 pontos.

Nesse caso, qual é a conduta mais adequada?

- (A) Chamar o neurologista de plantão.
- (B) Uso de um comprimido de nifedipina 20 mg sublingual.
- (C) Uso de 300 mg de ácido acetilssalicílico (AAS) por via oral.
- (D) Uso de 20 mg de rivaroxabana por via oral.
- (E) Controle da pressão arterial com medicação endovenosa – alvo abaixo de 180x100 mmHg – seguido de trombólise com alteplase 9 mg/Kg, na ausência de contraindicações.

Questão Cgeral_19

Um paciente, vítima de acidente automobilístico, chega ao hospital trazido pela equipe de atendimento pré-hospitalar já intubado, hemodinamicamente instável e anisocórico. Na admissão, foi realizada tomografia computadorizada de crânio que mostrou imagem hiperdensa no encéfalo, próximo à calota craniana, em região parietal, de aspecto côncavo-convexo e com importante desvio de linha média. Qual é o diagnóstico e o tratamento mais indicado para esse paciente?

- (A) Hematoma epidural / Abordagem cirúrgica.
- (B) Hematoma subdural / Abordagem cirúrgica.
- (C) Hematoma intraparenquimatoso / Monitorização da pressão intracraniana.
- (D) Lesão axonal difusa / Abordagem cirúrgica.
- (E) AVC isquêmico / Manitol endovenoso.

Questão Pediat_11

Você está de férias, na praia, quando se depara com um afogamento. A vítima está desacordada, parece ter 16 anos, aproximadamente, e está sendo retirada da água. Ela é colocada na areia, em decúbito dorsal, e você vai prestar o atendimento inicial. Uma ambulância já foi chamada e chegará em poucos minutos. Das alternativas a seguir, qual deve ser a sua próxima atitude?

- (A) Estabilização de cervical.
- (B) Ventilação de resgate.
- (C) Posicionar o paciente em decúbito lateral.
- (D) Manobra de Heimlich.
- (E) Compressões abdominais.