

BANCA: REVALIDA UFMT

PROVA: 1ª ETAPA (TEÓRICA)

MODELO DE PROVA: AMARELA

QUESTÃO: 14

Prezados examinadores,

A questão 14 aborda o tema “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Exacerbada” e pede para assinalar a alternativa que descreve a conduta inicial a ser realizada.

Um homem de 72 anos chega ao pronto atendimento com tosse produtiva, expectoração clara e dispneia há 5 dias. Tabagista de longa data e hipertenso. Ao exame físico, apresenta tiragem intercostal e batimento de asa nasal, PA = 160 x 100mmHg. FC = 120bpm, FR = 26irpm, Tax = 36,8°C, SatO₂ = 88%. Ausculta pulmonar revela sibilos difusos e murmúrio vesicular diminuído. Exames laboratoriais mostram Hb de 16.1g/dL, Ht de 42% e leucócitos = 7.300/mm³. Gasometria arterial mostra pH = 7,27, PaO₂ = 54, PaCO₂ = 70 e HCO₃ = 26. Raio X do tórax com sinais de hiperinsuflação pulmonar.

Qual conduta inicial deve ser realizada nesse paciente?

[A] Administrar corticosteroides sistêmicos e iniciar broncodilatadores.

[B] Iniciar ventilação mecânica invasiva e administrar antibióticos de amplo espectro.

[C] Administrar oxigênio suplementar e iniciar broncodilatadores.

[D] Iniciar terapia anticoagulante para tromboembolismo pulmonar.

O gabarito preliminar fornecido refere que a alternativa correta é a alternativa C, porém esta alternativa parece não ser a única correta. No entanto o Harrison, em seu capítulo 260 orienta:

“Tratamento das exacerbações agudas... os pacientes costumam ser tratados com beta-agonista inalante, frequentemente com acréscimo de um agente anticolinérgico.. Esses fármacos podem ser administrados juntos ou separados e a frequência da administração depende da gravidade.

“ [...] Entre pacientes internados, demonstrou-se que o uso de glicocorticoides sistêmicos reduz a estada hospitalar, acelera a recuperação e diminui as chances de exacerbação ou recidiva subsequentes em um período de até 6 meses. “

Por fim, em relação à oxigenação suplementar, é orientado:

“[...]O O₂ suplementar deve ser administrado para manter saturações arteriais $\geq 90\%$. “

Ou seja, de acordo com o exposto, entendemos que o exposto na alternativa também representaria uma conduta inicial a ser realizada neste paciente. Dessa forma, a questão apresentaria duas alternativas corretas: Alternativa A e C. Sendo assim, solicitamos respeitosamente por meio deste a anulação desta questão.

Fonte: HARRISON, T.R. Medicina Interna. 19a ed. Rio de Janeiro:. Ed AMGH, 2019.