

## MODELO DE RECURSO

### PROVA: ENARE (ACESSO DIRETO)

#### QUESTÃO: 8 (TIPO 4)

“Uma criança de 4 anos é levada pelos pais à UBS após queda da própria altura enquanto brincava com os primos. Ao examina-la, o médico observa um pequeno corte no queixo e, após limpeza da lesão e exame clínico, determina a necessidade de sutura. Sabendo que a criança pesa cerca de 15 kg, assinale a conduta adequada para preparação desse procedimento.

- A) Deve-se utilizar fio de náilon 5-0 e preparar lidocaína com vasoconstritor a 1% para anestesia. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.
- B) Deve-se utilizar fio de náilon 3-0 e preparar lidocaína com vasoconstritor a 1% para anestesia. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.
- C) Deve-se utilizar fio de náilon 3-0 e orientar os pais sobre o risco da anestesia, contraindicando o uso de anestésicos injetáveis. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.
- D) Deve-se utilizar fio de náilon 3-0 e preparar lidocaína sem vasoconstritor a 1% para anestesia. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.
- E) Deve-se utilizar fio de náilon 5-0 e preparar lidocaína sem vasoconstritor a 1% para anestesia. Deve-se, ainda, solicitar uma ou duas pessoas para auxiliar na segurança da sutura.”

Prezados Examinadores,

A questão 88 aborda o tema “Anestésicos locais”. No caso clínico da questão, uma criança de 2 anos de idade, pesando 15 kg, apresentava um pequeno corte no mento após queda da própria altura.

O gabarito preliminar sinalizou como sendo correta a alternativa “A”, na qual a orientação seria realizar a sutura com fio de náilon 5-0 e preparar lidocaína com vasoconstritor a 1% para anestesia. No entanto, a alternativa “E” também está correta. Por se tratar de um ferimento pequeno, sem relato de sangramento ativo, a anestesia local pode ser feita com uso de lidocaína a 1% sem a necessidade de vasoconstritor.

Portanto, muito respeitosamente, solicito a anulação do gabarito referente à questão 88, por apresentar duas alternativas corretas (“A” e “E”)

### Referências

TOWNSEND, C. et al. Sabiston - **Tratado de Cirurgia**: A base biológica da prática cirúrgica moderna. 20ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

Uptodate: **“Subcutaneous infiltration of local anesthetics”**  
[https://www.uptodate.com/contents/subcutaneous-infiltration-of-local-anesthetics?sectionName=Lidocaine&search=sutura%20de%20ferimentos%20em%20face&topicRef=13875&anchor=H2&source=see\\_link#H2](https://www.uptodate.com/contents/subcutaneous-infiltration-of-local-anesthetics?sectionName=Lidocaine&search=sutura%20de%20ferimentos%20em%20face&topicRef=13875&anchor=H2&source=see_link#H2)