

ORIENTAÇÃO DE RECURSOS

BANCA: HCPA

ANO: 2023

QUESTÃO: 44

Prezada banca examinadora

A questão 44 trata sobre **reintrodução de anticoagulantes em cirurgias com baixo risco de sangramento**.

A varfarina e a terapia ponte (Enoxaparina ou heparina) podem ser reintroduzidas com segurança em 12 a 24 horas após a cirurgia^{1,2,3}, normalmente na noite do dia da cirurgia ou na noite do dia seguinte à cirurgia, assumindo que não houve problemas cirúrgicos inesperados que aumentariam o risco de sangramento e que o paciente apto a receber medicações por via oral^{1,2}. A dose da varfarina é a mesma que o paciente estava recebendo no pré-operatório¹.

Desse modo, valendo-se da bibliografia atual, entende-se que as alternativas B e C podem ser consideradas como corretas.

Logo, por existirem duas alternativas contemplam o enunciado, solicito gentilmente a anulação da questão para que permaneça a assertividade do presente certame.

Atenciosamente,

.....

Referências bibliográficas:

1. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/perioperative-management-of-patients-receiving-anticoagulants?search=warfarin%20perioperative&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H753184
2. [Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer FA, et al. Perioperative management of antithrombotic therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines.](#)
3. SABISTON, David C. et al. Sabiston Textbook of SURgery: 20ed, 1v p219