

ORIENTAÇÃO DE RECURSOS

PROVA: UNICAMP 2024 (ACESSO DIRETO)

QUESTÃO: 79

Prezada banca examinadora,

A questão 79 sobre a dose tóxica dos anestésicos locais.

A dose tóxica de lidocaína sem vasoconstritor está entre de 4 a 5mg/kg, segundo as principais bibliografias especializadas.¹²³⁴. Podendo atingir o máximo de 300mg para pessoas acima de 60kg.¹

Em um frasco de lidocaína a 1%, 300mg equivale a dose de 30ml em volume. Assim, segundo a literatura médica atual, o gabarito fornecido não contempla adequadamente a pergunta feita pelo enunciado. Portanto, solicito gentilmente que o gabarito seja modificado para 30ml ou 300mg.

Atenciosamente,

Referência bibliográfica:

1. https://www.uptodate.com/contents/subcutaneous-infiltration-of-local-anesthetics?search=lidocaine&source=search_result&selectedTitle=4~125&usage_type=default&display_rank=3
2. SABISTON, David C. et al. Sabiston Textbook of SURgery: 20ed, p380
3. McCreight A, Stephan M. Local and regional anesthesia. In: Textbook of Pediatric Emergency Procedures, 2nd edition, King C, Henretig FM (Eds), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2008.
4. McGee DL. Anesthetic and analgesic technique. In: Roberts and Hedges Clinical Procedures in Emergency Medicine, 5th edition, Roberts JR, Hedges JR (Eds), Saunders Elsevier, Philadelphia 2010.