GABARITO PÓS-RECURSO

PROVA DISCURSIVA

R4 – ULTRASSONOGRAFIA (603)

As inclusões e/ou alterações de gabarito se encontram em vermelho.

QUESTÃO 01)

São marcos ultrassonográficos que permitem confirmar a gestação não evolutiva no primeiro trimestre:

1. Saco gestacional ≥ 25mm, sem vesícula vitelina ou embrião;
2. Ausência de embrião com batimento cardíaco embrionário de 11 a 14 dias após visualização de saco gestacional sem vesícula vitelina;
3. Embrião ≥ 7mm, sem batimentos cardíacos;
4. Ausência de embrião com atividade cardíaca em casos previamente documentados.

QUESTÃO 02)

Marcadores do exame morfológico que requerem avaliação mais detalhada na busca por novos achados:

- Afastamento entre primeiro e segundo dedos do pé;
- Ângulo ilíaco alargado;
- Artéria subclávia direita aberrante;
- Artéria umbilical única;
- Atresia duodenal;
- Atresia esofágica;
- Aumento de prega nucal;
- Cisto de plexo coroide;
- Clinodactilia (hipoplasia da falange média do 5º dedo);
- Complexo de Dandy-Walker;
- Encurtamento de fêmur;
- Encurtamento de orelha;
- Encurtamento de úmero;
- Fenda labial;
- Foco intracardíaco hiperecogênico (Golf-ball);
- Hérnia diafragmática;
- Hipoplasia/ausência de osso nasal;
- Holoprosencefalia/braquicefalia;
- Intestino hiperecogênico;
- Malformações cardíacas;
- Micrognatia/”flat face”;
- Onfalocele;

GABARITO PÓS-RECURSO

PROVA DISCURSIVA

R4 – ULTRASSONOGRAFIA (603)

- Pieloectasia;
- Prega palmar transversa única;
- Restrição do crescimento intrauterino;
- Ventriculomegalia.

Será considerada correta referência a achado anormal das estruturas: polo cefálico, coluna, abdômen, trato urinário, tórax, eixo longitudinal, membros, face, lábios, órbitas.

QUESTÃO 03)

Achados correspondentes aos cinco estágios de gravidade de Quintero, para classificação da STFF:

Estágio 1: oligodramnia/polidramnia. Bexiga visível e Doppler normal em ambos os fetos;
Estágio 2: bexiga do feto doador não visualizada;
Estágio 3: Doppler alterado em qualquer feto;
Estágio 4: ascite ou hidropsia fetal;
Estágio 5: morte de um ou ambos os fetos.

QUESTÃO 04)

Parâmetros ultrassonográficos a serem avaliados:

- Estimativa de peso fetal;
- Avaliação de líquido amniótico;
- Avaliação de circunferência abdominal;
- Dopplerfluxometria reservada para casos de restrição de crescimento diagnosticado previamente.